



Fertinara

Cultivamos el futuro

CATÁLOGO 2025

ÍNDICE



ACTIVADORES FISIOLÓGICOS

ALGAS PLUS	5
INCENTIVE	6
AUXICE	7
AUXICE MAX	8
FOLAMIN 15	9
FOLAMIN 30	10
FOLAMIN SIAPISA	11
ITALIN	12
FOLAMIN VEG-AMINO	13
FOLAMIN 78 WSP	14
AGROCÉ COMPLEX AMIN	15
AGROCÉ COMPLEX CUAJE	16
AGROCÉ FLOR + C	17
ORGANFER	18
AGROCÉ ENRAIZANTE	19
AGROCÉ DIRECT ROOTING	20



RESTAURADORES DE FERTILIDAD

AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS	23
HUMUSPOWER K-8	24
HUMUSPOWER ENERGY	25
HUMUSPOWER PLUS	26
AGROCÉ HÚMICO WSP	27
AGROCÉ HUMIFER	28
AGROCÉ CALCISAN	29
C-ACTIV-PUS	30



MICRONUTRICIÓN DE PRECISIÓN

AGROCÉ BORO	33
AGROCÉ BORMI	34
AGROCÉ CALCIO 10	35
AGROCÉ CALCIO + AA	36
AGROCÉ CALIBOR	37
AGROCÉ Fe EDDHA	38
AGROCÉ Fe-L	39
AGROCÉ NUTRICE HIERRO	40
AGROCÉ MAGNESIO	41
AGROCÉ MAGNESIO + AA	42
AGROCÉ MANGANESO	43
AGROCÉ NUTRICE MANGANESO	44
AGROCÉ ZINC	45
AGROCÉ NUTRICE ZINC	46
AGROCÉ BOROPLUS MAGNESIO	47
AGROCÉ BOROPLUS Mg-Zn	48
AGROCÉ NUTRICE N+C+M	49

ÍNDICE

AGROCÉ CORRIGE + 3	50
AGROCÉ Zn+Mn MAXI	51
AGROCÉ Zn+Mn RADICULAR	52
AGROCÉ MIX Q-7	53
AGROCÉ MIXLAND	54
AGROCÉ MIXTRAL	55
AGROCÉ MIX Q-6	56



POTENCIADORES DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN

AGROCÉ K-33 ACID	59
AGROCÉ K-44 EXPRESS	60
AGROCÉ POTASIO K-52	61
AGROCÉ POTASIO TURBO	62
AGROCÉ NEUTRAL POTASH	63
AGROCÉ X-23	64



SOLUCIONES AGRONÓMICAS ESPECIALIZADAS

AGROCÉ CONTROL pH + 2	67
AGROCÉ CONTROL pH + 3	67
AGROCÉ GLUCUCÉ	68



NUTRICIÓN FOLIAR ESTRATÉGICA

AGROCÉ FOLIARES SOLUBLES	71
AGROCÉ FOLIARES LÍQUIDOS	72
AGROCÉ NITRO PLUS 42	72



NUTRICIÓN HIDROSOLUBLE: PRECISIÓN Y EVOLUCIÓN

CRISTALINOS SOLUBLES FERTIRRIGACION	75
HIDROSOLUBLE INNOVATIVE PLUS	76



La familia de Activadores Fisiológicos ha sido formulada para optimizar la fisiología vegetal mediante la activación de rutas metabólicas clave. Su acción promueve una mayor eficiencia fotosintética, optimiza la translocación de fotoasimilados y mejora procesos críticos como la floración, el cuajado y el engorde del fruto.

Estos bioestimulantes favorecen el desarrollo radicular al incrementar la expresión de transportadores de nutrientes, mejorando la absorción y asimilación de elementos esenciales. Además, estimulan la síntesis de fitohormonas endógenas y refuerzan la respuesta de la planta frente a factores de estrés abiótico.

El resultado es un incremento en la calidad, uniformidad y rendimiento de la cosecha, permitiendo una producción más eficiente y rentable.

**1**

ACTIVADORES FISIOLÓGICOS

**ALGAS PLUS
INCENTIVE
AUXICE
AUXICE MAX
FOLAMIN 15
FOLAMIN 30
FOLAMIN SIAPISA
ITALIN
FOLAMIN VEG-AMINO
FOLAMIN 78 WSP
AGROCÉ COMPLEX AMIN
AGROCÉ COMPLEX CUAJE
AGROCÉ FLOR + C
ORGANFER
AGROCÉ ENRAIZANTE
AGROCÉ DIRECT ROOTING**

ALGAS PLUS

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO

ALGAS PLUS es un producto 100 % natural. Es un estimulante natural que interviene en los procesos fisiológicos de las plantas. Su fuerte actividad hormonal provocada por las citoquininas estimula de forma natural el metabolismo de la planta favoreciendo su crecimiento, floración, cuajado y engorde. Por su contenido en potasio se puede utilizar también para engorde y maduración.

Además **ALGAS PLUS** activa la producción de hormonas de crecimiento provocado por los ácidos alginicos, polisacáridos y enzimas, y aumenta las defensas naturales de las plantas.

CONTENIDO DECLARADO

Ácido Algínico	1,50 % m/m
Manitol	0,50 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	4,00 % m/m
Extracto de ASCOPHYLLUM NODOSUM	247,5-252,5 g/L
pH: 8,5-10,5 / Densidad: 1,10-1,15 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En arranque vegetativo cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Frutales	En arranque vegetativo cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Hortícolas	En arranque vegetativo cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Vid	En arranque vegetativo cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Plátanos	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de llenado de frutos.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-10 L/ha
Tropicales	En arranque vegetativo cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En arranque vegetativo cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Viveros Ornamentales	En arranque vegetativo cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 2-5 cc/m ²
Olivo	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

INCENTIVE

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO

INCENTIVE es un concentrado natural de algas cuya extracción se realiza en medio neutro consiguiendo que todas las sustancias naturales de las algas se mantengan intactas tras el proceso productivo.

Tras su extracción el concentrado de algas contiene todos los nutrientes, reguladores de crecimiento y polisacáridos que harán mejorar el crecimiento de la planta y además conseguirá hacerla más resistente a infecciones y posible estrés medio ambiental.

CONTENIDO DECLARADO

Ácido Algínico	3,00 % m/m
Manitol	1,00 % m/m
Extracto de ASCOPHYLLUM NODOSUM	300 g/L
pH: 4,5-5,5 / Densidad: 1,13-1,16 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Prefloración, floración, inicio de engorde y antes de la recolección.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1-2 L/ha Radicular: 3-5 L/ha
Frutales	Floración, caída de pétalos, formación de frutos y engorde.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1-2 L/ha Radicular: 3-5 L/ha
Hortícolas	15 días más tarde del inicio de brotación, cuaje y engorde de cada floración.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1-2 L/ha Radicular: 3-5 L/ha
Vid	10-15 cm brotación, floración, envero y después de vendimia.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1-2 L/ha Radicular: 3-5 L/ha
Plátanos	Corte madre, floración, llenado de frutos, segundo llenado de frutos.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 3-7 L/ha
Tropicales	Vía foliar en floración y cuaje. Vía radicular engorde.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1-2 L/ha Radicular: 3-5 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	15 días más tarde del inicio de brotación, cuaje y engorde de cada floración.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1-2 L/ha Radicular: 3-5 L/ha
Viveros Ornamentales	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 150-200 cc/hl Radicular: 2-3 cc/m ²
Olivo	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde.	Foliar: 150-200 cc/hl Dosis general: 1-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

AUXICE

SOLUCIÓN NK 4-5 CON EXTRACTO DE ALGAS Y AMINOÁCIDOS

AUXICE es un estimulante que favorece la floración, cuajado y engorde de los frutos. Es un producto formulado con aminoácidos muy activos, giberelinas y auxinas de origen natural y citoquininas de las conocidas algas de mares fríos y fuertes mareas *Ascophyllum Nodosum*. La perfecta proporción de sus materias activas potencian toda la actividad hormonal de la planta ayudando a todos los procesos mencionados anteriormente.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,15, Ácido Glutámico: 0,16, Serina: 0,22, Histidina: 0,06, Glicina: 0,26, Treonina: 0,10, Arginina: 0,14, Alanina: 0,35, Valina: 0,06, Isoleucina: 0,044, Fenilalanina: 0,054, Leucina: 0,13, Lisina: 0,044, Prolina: 0,19, Cisteína: 0,038.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	2,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	4,00 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	2,10 % m/m
Nitrógeno (N) Nítrico	0,73 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	1,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	5,10 % m/m
Manitol	0,28 % m/m

pH: 6-8 / Densidad: 1,10-1,15 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 20 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Frutales	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Hortícolas	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Vid	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Plátanos	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-10 L/ha
Tropicales	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-8 L/ha
Viveros Ornamentales	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 2-5 cc/m ²
Olivo	Desde prefloración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha

AUXICE MAX

ABONO ORGANO-MINERAL PK LÍQUIDO

AUXICE MAX es un producto proveniente de extractos vegetales de diferentes plantas y cuya extracción se realiza por procedimientos enzimáticos totalmente controlados. Por su forma de elaboración obtenemos de las plantas una mezcla equilibrada de auxinas, giberelinas y otros principios activos que están especialmente ligados con el desarrollo equilibrado de los cultivos.

La función principal del producto **AUXICE MAX** es la alta sistemía a través de hoja, raíz y madera, potenciando el movimiento de la savia facilitando la realización de los procesos fisiológicos vegetales tan fundamentales como la fotosíntesis, la respiración y la nutrición.

Al existir una mayor vasculación de la savia, se disminuyen los tiempos necesarios para que la planta complete sus diferentes fases de cultivo. Ello provoca un aumento y adelanto de la cosecha en muchos cultivos.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	1,50 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	4,10 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro y en agua	4,10 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,00 % m/m
Boro (B) soluble en agua	0,70 % m/m
Carbono (C) Orgánico	4,35 % m/m

pH: 7 / Densidad: 1,09 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 7 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos y Frutales	Falta de floración, a caída de pétalos y engorde.	Foliar: 100-150 cc/hl hasta 30 % de caída de pétalos Foliar: 75-100 cc/hl 15 días después de la 1ª
Hortícolas	Falta de floración, a caída de pétalos y engorde.	Foliar: 100-200 cc/hl varias aplicaciones
Vid	En botones florales separados e inicio de floración.	Foliar: 1-2 L/ha
Plátanos	Llenado de fruta.	Foliar: 100-200 cc/hl
Tropicales	Inicio de floración y cuando terminen de caer las flores.	Foliar: 100-200 cc/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Falta de floración, a caída de pétalos y engorde.	Foliar: 100-200 cc/hl varias aplicaciones
Olivo	En arranque vegetativo, a caída de pétalos y engorde.	Foliar: 50-100 cc/hl

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

En aplicación foliar se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general, en aplicaciones de bajo volumen de agua, aplicar la dosis máxima. Cuando se quieran utilizar productos que contengan calcio, hacer prueba previa de incompatibilidad. En hortalizas se utilizará en todos los racimos o floraciones en que se quiera actuar. Evitar las horas centrales del día cuando más calor hace. Cuando utilicemos varios productos en la mezcla, aplicar reguladores de pH.

Inscrito en el MAPAMA con el nº F0002639/2026

FOLAMIN 15

AMINOÁCIDOS

FOLAMIN 15 es un estimulante que produce un efecto antiestrés provocado por las adversidades meteorológicas, parasitarias, contaminaciones tóxicas e intervenciones antrópicas negativas. Mejora los procesos biológicos al inducir un aumento de la vegetación y la producción, incrementando la actividad y las dimensiones del sistema radicular. Son pues los aminoácidos libres los responsables de un perfeccionamiento significativo en el metabolismo de la planta ya que se absorben rápidamente, lo que favorece el desarrollo posterior de la misma.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 1,45, Ácido Glutámico: 3,67, Serina: 0,81, Histidina: 0,80, Glicina: 0,88, Treonina: 0,23, Arginina: 1,08, Alanina: 1,08, Tirosina: 0,24, Valina: 0,79, Metionina: 0,20, Isoleucina: 0,16, Fenilalanina: 0,85, Leucina: 0,67, Lisina: 1,08, Hidroxiprolina: 0,26, Prolina: 0,75.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	15,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	4,50 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	3,00 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	1,50 % m/m

pH: 5-6 / Densidad: 1,18-1,22 g/cc
Este producto, por su procedencia, contiene un 40 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Frutales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En ciruelo hacer prueba previa, muchas variedades de este frutal no son compatibles con aminoácidos.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Vid	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 5-10 L/ha
Plátanos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Tropicales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Viveros Ornamentales	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 250-300 cc/hl Radicar: 3-4 cc/m ²
Olivo	Aplicar en inicio de brotación, en engorde de otoño y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-2,5 L/ha
Cereales	Junto con los tratamientos de herbicidas o fitosanitarios.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se puede aplicar asociado a los tratamientos fitosanitarios pero es muy recomendable mezclarlo junto a un abono foliar AGROCE para que la estimulación del producto sea totalmente satisfactoria para el cultivo.

FOLAMIN 30

AMINOÁCIDOS

FOLAMIN 30 es un estimulante con un alto contenido en aminoácidos procedentes de hidrólisis de proteínas (hidrólisis ácida de la queratina natural). Además de estimulante foliar provoca, cuando se aplica vía radicular, una estimulación de producción de nuevas raíces, y una mejora de la actividad microbiana en el suelo. La rápida asimilación del producto por parte de la planta junto a su acción estimulante produce una gran reacción vegetativa en cualquier tipo de cultivo.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 2,67, Ácido Glutámico: 6,62, Serina: 1,45, Histidina: 1,43, Glicina: 1,57, Treonina: 0,41, Arginina: 1,94, Alanina: 1,94, Tirosina: 0,44, Valina: 1,41, Metionina: 0,36, Isoleucina: 0,29, Fenilalanina: 1,51, Leucina: 1,20, Lisina: 1,94, Hidroxiprolina: 0,47, Prolina: 1,35.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	27,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	8,02 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	5,41 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	2,61 % m/m

pH: 5-6 / Densidad 1,18-1,22 g/cc
Este producto, por su procedencia, contiene un 40 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Frutales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. No aplicar en ciruelo.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Vid	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-10 L/ha
Plátanos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Tropicales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Viveros Ornamentales	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 100-200 cc/hl Radicular: 3-4 cc/m ²
Olivo	Aplicar en inicio de brotación, en engorde de otoño y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 2-2,5 L/ha
Cereales	Junto con los tratamientos de herbicidas o fitosanitarios.	Foliar: 100-300 cc/hl General: 1-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se puede aplicar asociado a los tratamientos fitosanitarios pero es muy recomendable mezclarlo junto a un abono foliar AGROCE para que la estimulación del producto sea totalmente satisfactoria para el cultivo.

FOLAMIN SIAPISA

AMINOÁCIDOS

FOLAMIN SIAPISA contiene aminoácidos provenientes de un proceso de hidrólisis controlada de proteínas de origen animal. Su acción estimulante produce una reacción vegetativa intensa sobre toda clase de cultivos. Aplicado en los momentos de máxima necesidad de la planta proporciona a ésta los elementos estimulantes necesarios para completar con satisfacción los ciclos naturales de crecimiento, cuaje y engorde.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,70, Ácido Glutámico: 1,23, Alanina: 0,38, Arginina: 0,50, Cistina: 0,26, Fenilalanina: 0,36, Glicina: 1,65, Isoleucina: 0,30, Histidina: 0,24, Leucina: 0,63, Lisina: 0,31, Prolina: 1,07, Serina: 0,96, Tirosina: 0,10, Treonina: 0,90, Valina: 0,41.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	10,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	9,24 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	8,65 % m/m

pH: 6-7 / Densidad 1,23-1,25 g/cc
Este producto, por su procedencia, contiene un 57 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Frutales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. No aplicar en ciruelo sin hacer prueba previa.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Vid	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 5-20 L/ha
Plátanos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Tropicales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Viveros Ornamentales	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 2-5 cc/m ²
Olivo	Aplicar en inicio de brotación, en engorde de otoño y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha
Cereales	Junto con los tratamientos de herbicidas o fitosanitarios.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 1-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se puede aplicar asociado a los tratamientos fitosanitarios pero es muy recomendable mezclarlo junto a un abono foliar AGROCE para que la estimulación del producto sea totalmente satisfactoria para el cultivo.

ITALIN

AMINOÁCIDOS

ITALIN es un aminoácido de máxima calidad, obtenido por hidrólisis ácida sobre tejidos animales elegidos por su alto contenido en colágeno. Por su concentración en aminoácidos levógiros es un producto para aplicar en cualquier situación de estrés que padezcan los cultivos.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,46, Ácido Glutámico: 0,51, Alanina: 1,12, Arginina: 0,42, Cistina: 0,12, Fenilalanina: 0,17, Glicina: 0,81, Isoleucina: 0,14, Histidina: 0,18, Leucina: 0,41, Lisina: 0,14, Prolina: 0,61, Serina: 0,70, Treonina: 0,32, Valina: 0,19.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	6,30 % m/m
Nitrógeno (N) Total	6,80 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	6,50 % m/m

pH: 6-7 / Densidad 1,20-1,25 g/cc
Este producto, por su procedencia, contiene un 47 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Frutales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En ciruelo hacer prueba previa, muchas variedades de este frutal no son compatibles con aminoácidos.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Vid	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 5-10 L/ha
Plátanos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Tropicales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Viveros Ornamentales	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta. En riego en cada brotación.	Foliar: 250-300 cc/hl Radicular: 3-4 cc/m ²
Olivo	Aplicar en inicio de brotación, en engorde de otoño y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 250-500 cc/hl General: 2-2,5 L/ha
Cereales	Junto con los tratamientos de herbicidas o fitosanitarios.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 1,5-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se puede aplicar asociado a los tratamientos fitosanitarios pero es muy recomendable mezclarlo junto a un abono foliar AGROCE para que la estimulación del producto sea totalmente satisfactoria para el cultivo.

FOLAMIN VEG-AMINO

AMINOÁCIDOS

FOLAMIN VEG-AMINO es un producto formulado a base de aminoácidos libres que se obtienen mediante la hidrólisis de proteínas de origen VEGETAL. Actúa como activador de la fisiología vegetal y de los procesos hormonales de los cultivos. Estimula la función clorofílica de la planta y ayuda al desarrollo vegetativo de los cultivos ahorrándole una gran cantidad de energía.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,60, Ácido Glutámico: 7,09, Alanina: 1,33, Fenilalanina < 0,01, Glicina: 0,10, Histidina: 0,04, Isoleucina: 0,02, Leucina: 0,04, Lisina: 0,08, Metionina < 0,01, Prolina: 0,01, Serina: 0,02, Tirosina: 0,29, Treonina: 0,17, Triptófano < 0,01, Valina: 0,21.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	10,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	6,50 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	3,00 % m/m
Nitrógeno (N) Amoniacal	3,50 % m/m

pH: 6,4-6,6 / Densidad: 1,20-1,25 g/cc
Este producto, por su procedencia, contiene un 40 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador.	Foliar: 150-250 cc/hl Radicar: 5-20 L/ha
Frutales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados. No aplicar en ciruelo sin hacer prueba previa.	Foliar: 150-250 cc/hl Radicar: 5-20 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta.	Foliar: 150-250 cc/hl Radicar: 5-25 L/ha
Vid	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 150-250 cc/hl Radicar: 5-20 L/ha
Plátanos	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 150-250 cc/hl Radicar: 5-20 L/ha
Tropicales	Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 150-250 cc/hl Radicar: 5-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta.	Foliar: 150-250 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha en varias aplicaciones Radicar: 5-25 L/ha
Viveros Ornamentales	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la planta.	Foliar: 150-250 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha en varias aplicaciones Radicar: 2-5 cc/m ²
Olivo	Aplicar en inicio de brotación, en engorde de otoño y en momentos de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fitosanitarios autorizados.	Foliar: 150-250 cc/hl General: 1,5-2,5 L/ha
Cereales	Junto con los tratamientos de herbicidas o fitosanitarios.	Foliar: 150-250 cc/hl General: 1-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Puede ser empleado solo o asociado a los tratamientos contra plagas o enfermedades en aplicación foliar y como complemento de la fertirrigación en aplicación radicular, previa comprobación de la compatibilidad de las mezclas.

FOLAMIN 78 WSP

AMINOÁCIDOS

FOLAMIN 78 WSP es un estimulante con un alto contenido en aminoácidos procedentes de la hidrólisis de proteínas (hidrólisis ácida de la queratina natural), con una de las mayores concentraciones del mercado en L-aminoácidos de rápida asimilación. Posee un 78 % - 80 % de L-aminoácidos, totalmente disponibles y asimilables por la planta, se caracteriza además por la alta concentración de "Serina y Prolina", como agentes antiestrés frente a procesos térmicos o hídricos. Es un formulado en polvo soluble que garantiza la máxima facilidad de dosificación y solubilidad.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido aspártico: 5,70, Alanina: 3,76, Cisteína: 1,95, Glicina: 6,19, Isoleucina: 3,83, Lisina: 1,46, Prolina: 8,54, Tirosina: 0,85, Valina: 6,48, Ácido glutámico: 8,58, Arginina: 5,58, Fenilalanina: 4,03, Histidina: 0,58, Leucina: 6,30, Metionina: 0,37, Serina: 10,00, Treonina: 3,80.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	78,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	11,40 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	11,40 % m/m

pH: 5 (10 % disolución)

Este producto, por su procedencia, contiene un 90 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Frutales	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Hortícolas	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Vid	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Plátanos	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Tropicales	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Viveros Ornamentales	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar masa radicular.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Olivo y Oleaginosas en general	Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos
Cereales, Alfalfa y Arroz	Dos aplicaciones en fase de crecimiento y formación de fruto.	Foliar: 0,5 kg/ha
Café	Durante el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta para movilizar savia y en fase de engorde.	Foliar: 0,50-100 g/hl Radicular: 1,5-5 kg/ha repartido en varios riegos

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Por sus condiciones físicas es aconsejable hacer una disolución previa. Se recomienda mantener el producto en su envase original y bien tapado sin exposición al sol. Por sus condiciones fisicoquímicas el producto se puede aplicar en aplicación foliar como en todo tipo de sistemas de riego y en inyección directa.

AGROCÉ COMPLEX AMIN

SOLUCIÓN NPK 10 - 6 - 6 CON MICRONUTRIENTES QUELADOS EDTA Y AMINOÁCIDOS

AGROCÉ COMPLEX AMIN es una fórmula equilibrada y universal para cualquier tipo de cultivo desde arranque vegetativo hasta prefloración. La combinación del NPK junto al aminoácido que incorpora favorece la rapidísima traslocación de los nutrientes por todo el cultivo de forma inmediata.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,19, Ácido Glutámico: 0,50, Serina: 0,11, Histidina: 0,10, Glicina: 0,12, Treonina: 0,03, Arginina: 0,14, Alanina: 0,14, Tirosina: 0,04, Valina: 0,10, Metionina: 0,03, Isoleucina: 0,02, Fenilalanina: 0,11, Leucina: 0,09, Lisina: 0,14, Hidroxiprolina: 0,03, Prolina: 0,11.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	2,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	10,00 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	0,60 % m/m
Nitrógeno (N) Amoniacal	1,82 % m/m
Nitrógeno (N) Nítrico	0,96 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	6,62 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	6,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,00 % m/m
Boro (B) soluble en agua	0,01 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,002 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	0,02 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,002 % m/m

pH: 6,5-7,5 / Densidad: 1,20-1,25 g/cc

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefloración y para momentos de estrés.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Frutales	Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefloración y para momentos de estrés.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Hortícolas	A partir de planta con tres hojas nuevas, en todas las nuevas brotaciones y para momentos de estrés.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Vid	Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefloración y para momentos de estrés.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Plátanos	Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefloración y para momentos de estrés.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Tropicales	Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefloración y para momentos de estrés.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	A partir de planta con tres hojas nuevas, en todas las nuevas brotaciones y para momentos de estrés.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Olivo	Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefloración y para momentos de estrés.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Café	Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefloración y para momentos de estrés.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Cereales	Junto con los herbicidas o cualquier otro tratamiento fitosanitario.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 1-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

AGROCÉ COMPLEX CUAJE

SOLUCIÓN NPK 4 - 11 - 8 CON MICRONUTRIENTES QUELADOS EDTA Y AMINOÁCIDOS

FERTINARA COMPLEX CUAJE es una fórmula equilibrada y universal para cualquier tipo de cultivo desde prefloración hasta engorde y maduración. La combinación del NPK para los momentos anteriormente enunciados junto al aminoácido y el boro favorecen el cuajado de cualquier tipo de cultivo y el posterior engorde del mismo. Además, la adecuada proporción de aminoácido favorece la rapidísima traslocación de los nutrientes de forma inmediata.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,19, Ácido Glutámico: 0,50, Serina: 0,11, Histidina: 0,10, Glicina: 0,12, Treonina: 0,03, Arginina: 0,14, Alanina: 0,14, Tirosina: 0,04, Valina: 0,10, Metionina: 0,03, Isoleucina: 0,02, Fenilalanina: 0,11, Leucina: 0,09, Lisina: 0,14, Hidroxiprolina: 0,03, Prolina: 0,11.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	2,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	4,00 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	0,40 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	3,20 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	11,00 % m/m
Oxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	8,00 % m/m
Boro (B) soluble en agua	0,60 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,002 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	0,02 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,002 % m/m
pH: 6-7 / Densidad 1,20-1,25 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Frutales	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Hortícolas	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Vid	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Plátanos	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Tropicales	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Olivo	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Café	Aplicar desde prefloración hasta engorde y maduración.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Cereales	Junto con los herbicidas o cualquier otro tratamiento fitosanitario.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 1-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

AGROCÉ FLOR + C

ABONO NP 3 - 15 CON BORO (B) Y MOLIBDENO (Mo)

AGROCÉ FLOR + C está especialmente formulado para obtener una floración y un buen cuajado de frutos. Su formulación combina una alta riqueza de boro y molibdeno con fósforo, buscando la sinergia de todos los componentes para conseguir mejor floración, un buen cuaje y un adecuado desarrollo de los frutos obtenidos. Su aplicación le permitirá, bajo condiciones de cultivo adecuadas, obtener una mejor floración y cuaje, mayor cosecha, más precocidad y frutos de mejor calidad.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	3,00 % m/m
Nitrógeno (N) Amoniacal	3,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	15,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro y en agua	15,00 % m/m
Boro (B) soluble en agua	8,00 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua	7,50 % m/m

pH: 6-7 (10% disolución)

Este producto, por su procedencia, contiene un 5 % de *Ascophyllum Nodosum*.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Melón	Sólo se aplica en caso que observemos poca flor para su utilización igual que en sandía.	Radicar: 2-3 kg/ha 1-2 aplicaciones
Sandía	Con el comienzo de la floración y la introducción de polinizadores, realizar 2 aplicaciones.	Radicar: 1 kg/ha 3-4 aplicaciones
Tomate y Berenjena	Aplicar en los primeros ramilletes florales.	Radicar: 2 kg/ha 3-4 aplicaciones
Calabacín	Con las primeras flores y regularmente conforme progrese la floración y cuajado de frutos.	Radicar: 3 kg/ha 3-4 aplicaciones
Pepino	Con las primeras flores y regularmente conforme progrese la floración y cuajado de frutos.	Radicar: 4 kg/ha 3-4 aplicaciones
Pimiento	Aplicar en caída de pétalos para las primeras flores.	Radicar: 2-3 kg/ha 2 aplicaciones

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

El producto está fabricado para su utilización radicular, pero se puede aplicar foliarmente bajo consejo técnico. Las aplicaciones sucesivas no se realizarán antes de pasados 15 días de la anterior. En caso de adversidades climatológicas se pueden aumentar las aplicaciones. Mantener el producto en su envase original.

ORGANFER

ABONO ORGÁNICO NK LÍQUIDO DE ORIGEN VEGETAL

ORGANFER es un nutriente orgánico líquido de origen vegetal. Su uso como nutriente orgánico está aceptado en agricultura ecológica. Por su composición está indicado en las fases importantes del ciclo vegetativo (crecimiento, cuaje y engorde) y en los momentos de máximo estrés de la planta. Los componentes de **ORGANFER** son rápidamente asimilados por la planta, mejorando la estructura de los suelos.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	3,20 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	2,80 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) Total	3,10 % m/m
Carbono (C) Orgánico	22,40 % m/m
C/N	8,00

pH: 5,5 / Densidad 1,20 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 38 % de materia orgánica y un 33 % de extracto húmico total.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando la dosis en momentos de brotación y engorde.	Radicar: 60-120 L/ha repartido en varios riegos
Frutales	Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando la dosis en momentos de brotación y engorde.	Radicar: 60-120 L/ha repartido en varios riegos
Hortícolas	Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando su aplicación en los momentos de crecimiento y repartiendo el resto de la dosis total durante todo el cultivo.	Radicar: 60-140 L/ha repartido en varios riegos
Vid	Aplicar en inicio de brotación hasta envero y en los momentos de estrés.	Radicar: 40-80 L/ha repartido en varios riegos
Plátanos	Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando la dosis en momentos de brotación y engorde.	Radicar: 80-200 L/ha repartido en varios riegos
Tropicales	Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando la dosis en momentos de brotación y engorde.	Radicar: 60-120 L/ha repartido en varios riegos
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando su aplicación en los momentos de crecimiento y repartiendo el resto de la dosis total durante todo el cultivo.	Radicar: 60-120 L/ha repartido en varios riegos
Viveros Ornamentales	Durante la estancia en vivero repartiendo en dosis semanales.	Radicar: 5-10 cc/m ² semanal
Olivo	Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando la dosis en momentos de brotación y engorde.	Radicar: 60-80 L/ha repartido en varios riegos

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Para aplicar por riego localizado, riego a manta o por inyección mecánica en la zona radicular. Se recomienda mezclar el producto con correctores que se tengan que aplicar por necesidad o por mantenimiento del cultivo. Se puede mezclar en el tanque de abonado, siempre que se tengan en cuenta las incompatibilidades de mezcla.

Inscrito en el MAPAMA con el nº F0002545/2025

AGROCÉ ENRAIZANTE

SOLUCIÓN NPK 5,8-1,5-1,2 CON MICRONUTRIENTES QUELADOS EDTA Y AMINOÁCIDOS

AGROCÉ ENRAIZANTE es un abono especial que contiene aminoácidos macronutrientes y micronutrientes quelados para ser aplicado en cualquier momento del trasplante, para desarrollar la masa radicular de cualquier cultivo en cualquier periodo, y para dar una nutrición completa vía suelo.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,54, Ácido Glutámico: 1,35, Serina: 0,29, Histidina: 0,29, Glicina: 0,32, Treonina: 0,08, Arginina: 0,39, Alanina: 0,40, Tirosina: 0,10, Valina: 0,29, Metionina: 0,07, Isoleucina: 0,06, Fenilalanina: 0,31, Leucina: 0,25, Lisina: 0,40, Hidroxiprolina: 0,09, Prolina: 0,27.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	5,50 % m/m
Nitrógeno (N) Total	5,81 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	1,10 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	4,44 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	1,50 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	1,20 % m/m
Boro (B) soluble en agua	0,025 % m/m
Cobre (Cu) EDTA soluble en agua y quelado EDTA	0,025 % m/m
Hierro (Fe) EDTA soluble en agua y quelado EDTA	0,035 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado EDTA	0,025 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado EDTA	0,025 % m/m

pH: 5-6 / Densidad: 1,18-1,23 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 20 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones
Frutales	En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones
Hortícolas	En el trasplante, y en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones
Vid	En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones
Plátanos	En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones
Tropicales	En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En el trasplante, y en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones
Viveros Ornamentales	En el trasplante, y en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 3-6 cc/m ² 2-4 aplicaciones
Olivo	En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor crecimiento, o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fitotoxicidad.	Radicular: 5-10 L/ha 2-4 aplicaciones

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto para aplicación radicular. Para una correcta aplicación del producto se recomienda agitar en el tanque de abonado. En riego a manta se recomienda aumentar las dosis un 25 %.

AGROCE DIRECT ROOTING

SOLUCIÓN PK12,2-2,6 CON AMINOÁCIDOS

En la composición de **FERTINARA DIRECT ROOTING** se han utilizado diversas materias activas, todas de origen natural a excepción del fósforo. Por su composición contiene aminoácidos, citoquininas, betainas, auxinas naturales, macros, y un alto porcentaje de materia orgánica, estos componentes hacen que las raíces tengan más longevidad y resistencia a algunos ataques de patógenos además de estar promoviendo continuamente la estimulación de nuevas raíces.

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,40, Ácido Glutámico: 0,99, Serina: 0,21, Histidina: 0,21, Glicina: 0,23, Treonina: 0,06, Arginina: 0,29, Alanina: 0,29, Tirosina: 0,06, Valina: 0,21, Metionina: 0,05, Isoleucina: 0,04, Fenilalanina: 0,22, Leucina: 0,18, Lisina: 0,29, Hidroxiprolina: 0,07, Prolina: 0,20.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	4,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	1,73 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	1,25 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	12,25 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	2,64 % m/m

pH: 2-3 / Densidad 1,25-1,30 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 30 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	5-15 cc por pie en trasplante 25-50 cc por pie en adultos 2-3 aplicaciones según necesidad
Frutales	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	5-15 cc por pie en trasplante 25-50 cc por pie en adultos 2-3 aplicaciones según necesidad
Hortícolas	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	Radicular: 3-5 L/ha 2-4 aplicaciones Dosis total: 6-12 L/ha
Vid	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	5-15 cc por pie en trasplante 25-50 cc por pie en adultos 2-3 aplicaciones según necesidad
Plátanos	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	5 cc por pie en trasplante 5 cc por pie en adultos 2-3 aplicaciones según necesidad
Tropicales	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	Radicular: 2-3 L/ha 3-4 aplicaciones Dosis total: 6-12 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	Radicular: 3-6 L/ha 2-4 aplicaciones Dosis total: 6-12 L/ha
Viveros Ornamentales	En enraizamiento de esquejes y para formar masa radicular.	Radicular: 3-5 cc/m ² varias aplicaciones
Olivo	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	Radicular: 2-3 L/ha 3-4 aplicaciones Dosis total: 6-12 L/ha
Café	En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.	5-15 cc por pie en trasplante 25-50 cc por pie en adultos 2-3 aplicaciones según necesidad

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto para aplicación radicular. Para una correcta aplicación del producto se recomienda agitar en el tanque de abonado. En riego a manta se recomienda aumentar las dosis un 25 %.



El suelo es un recurso estratégico en la producción agrícola, y su calidad determina el potencial productivo del cultivo. Factores como la salinización, la compactación y la degradación química, física y biológica afectan la fertilidad del suelo, reduciendo la disponibilidad de nutrientes y limitando el rendimiento.

La familia **Restauradores de Fertilidad** incluye soluciones diseñadas para restaurar el equilibrio edáfico, optimizar la estructura del suelo y mejorar la disponibilidad de nutrientes esenciales. Estos productos contribuyen a la regeneración de la microbiota benéfica, la regulación del pH y la mitigación de los efectos del estrés salino, favoreciendo un entorno radicular más eficiente y productivo.

Al mejorar la salud del suelo, se incrementa la sostenibilidad y rentabilidad del sistema agrícola, asegurando cosechas de alta calidad y rendimiento óptimo.



2

RESTAURADORES DE FERTILIDAD

AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS

HUMUSPOWER K-8

HUMUSPOWER ENERGY

HUMUSPOWER PLUS

AGROCÉ HÚMICO WSP

AGROCÉ HUMIFER

AGROCÉ CALCISAN

C-ACTIV-PLUS

AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS

H-20

H-20-PLUS

H-25

ÁCIDOS HÚMICOS

AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS forma junto a las arcillas el complejo arcillo-húmico, reteniendo mucho más tiempo partículas de agua y nutrientes. Libera macro y micronutrientes, bloqueados por los excesos de carbonatos cálcicos existentes en nuestros suelos. Junto a los nutrientes componen un radical catiónico que favorece la introducción de la partícula alimenticia en la planta. Estimulan un mayor y más rápido desarrollo radicular y mejoran la vida bacteriana del suelo. Potencia los quelatos y evita la retrogradación de potasas y fosfatos.

CONTENIDO DECLARADO

	AGROCÉ H-20	AGROCÉ H-20-PLUS	AGROCÉ H-25
Extracto Húmico Total	20,00 % m/m	20,00 % m/m	25,00 % m/m
Ácidos Húmicos	10,00 % m/m	14,00 % m/m	10,00 % m/m
Ácidos Fúlvicos	10,00 % m/m	6,00 % m/m	15,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	7,00–9,00 % m/m	7,00–9,00 % m/m	7,00–9,00 % m/m

pH: 12-14 / Densidad: 1,14-1,20 g/cc

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Al inicio de la vegetación; a la caída de los pétalos; durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 20-40 L/ha
Frutales	Al inicio de la vegetación; a la caída de los pétalos; durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 20-40 L/ha
Hortícolas	En los primeros riegos, para desarrollar el bulbo radicular y fortalecer la vegetación; durante el ciclo de cultivo, intensificando en momentos de estrés.	Radicular: 20-50 L/ha Invernadero hasta 60 L/ha
Vid	Al inicio de la vegetación y en inicio de engorde.	Radicular: 20-40 L/ha
Plátanos	Repartir las dosis durante el ciclo vegetativo reforzando en momentos de máximo crecimiento.	Radicular: 20-50 L/ha Invernadero hasta 80 L/ha
Tropicales	Al inicio de la vegetación; a la caída de los pétalos; durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 20-40 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En los primeros riegos, para desarrollar el bulbo radicular y fortalecer la vegetación; durante el ciclo de cultivo, intensificando en momentos de estrés.	Radicular: 20-50 L/ha Invernadero hasta 60 L/ha
Viveros Ornamentales	En los primeros riegos, para desarrollar el bulbo radicular y fortalecer la vegetación; durante el ciclo de cultivo, intensificando en momentos de estrés.	Radicular: 2-3 cc/m ² cada aplicación
Olivo	Al inicio de la vegetación y en inicio de engorde.	Radicular: 20-40 L/ha
Café	Al inicio de la vegetación; a la caída de los pétalos; durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 20-40 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto para aplicación radicular por riego o inyección directa. Agitar los envases antes de aplicar al tanque de abonado. No mezclar con productos de pH ácido, ni con nitrato de calcio ni con aceites derivados del petróleo.
REACH: 01-2119484861-29-0023



HUMUSPOWER K-8

ÁCIDOS HÚMICOS

HUMUSPOWER K-8 es un producto de origen vegetal, "Leonardita" procedente de lignitos oxidados durante millones de años y sales potásicas totalmente solubles. Con las dosis indicadas aportamos al suelo suficientes ácidos húmicos, fúlvicos y materia orgánica para el normal desarrollo de las plantas que unido al contenido en potasa, hacen un producto ideal para aplicar como nutriente de fondo o parada invernal. Retienen durante más tiempo partículas de agua y nutrientes evitando el lavado por lixiviación (pérdida de las sales solubles o dispersables provocada por el agua). Mejoran la masa radicular de la planta, aumentando la superficie de absorción y como consecuencia aumenta el rendimiento de la fertilización.

CONTENIDO DECLARADO

Extracto Húmico Total	70,00 % m/m
Ácidos Húmicos	65,00 % m/m
Ácidos Fúlvicos	5,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,00 %–8,00 % m/m
pH: 9-11 (10 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En riego a manta junto con nitrógeno, en 1ª brotación y engorde. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicular: 100-150 kg/ha
Frutales	En riego a manta junto con nitrógeno, en 1ª brotación y engorde. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicular: 100-150 kg/ha
Hortícolas	Como nutriente orgánico de fondo antes de la plantación preferentemente concentrando en la zona de desarrollo radicular.	Radicular: 100-200 kg/ha
Vid	Aplicar a finales de invierno o principios de primavera. En zonas de gran producción mezclar con nitrógeno.	Radicular: 75-100 kg/ha
Plátanos	Durante los meses de febrero y marzo hacer dos aplicaciones.	Radicular: 150-200 kg/ha
Tropicales	En riego a manta junto con nitrógeno, en 1ª brotación y engorde. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicular: 100-150 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Como nutriente orgánico de fondo antes de la plantación preferentemente concentrando en la zona de desarrollo radicular.	Radicular: 100-200 kg/ha
Olivo	En secano a finales de invierno junto con nitrógeno. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicular: 100-150 kg/ha Árboles grandes Radicular: 250-500 g/pie
Café	En riego a manta junto con nitrógeno, en 1ª brotación y engorde. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicular: 100-150 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Este producto se puede aplicar con cualquier tipo mecánico con los que tradicionalmente se aplican los nutrientes minerales. Mantener el producto en lugar seco y aireado. Aunque para su descomposición no es necesario incorporarlo al subsuelo se aconseja una labor a continuación de la aplicación o aplicarlo con máquina incorporadora.

REACH: 01-2119484861-29-0023

HUMUSPOWER ENERGY

ÁCIDOS HÚMICOS

HUMUSPOWER ENERGY es una innovadora fórmula de origen vegetal, compuesta por leonardita procedente de lignitos oxidados durante millones de años, sales potásicas totalmente solubles y nitrógeno de liberación controlada. Desbloqueo de los nutrientes presentes en el suelo. Evita el lavado del nitrógeno por lixiviación. Produce aumento de la masa radicular y activa la microflora del suelo. Mejora la estructura del suelo y es el sustituto perfecto del estercolado además no produce malas hierbas.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	15,75 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	2,00 % m/m
Extracto Húmico Total	17,50 % m/m
Ácidos Húmicos	16,25 % m/m
Ácidos Fúlvicos	1,25 % m/m

pH: 7-8 (10 % disolución)

Este producto, por su procedencia, contiene un 17,50 % de materia orgánica y un 45 % de Trióxido de Azufre (SO₃) soluble en agua.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En riego a manta en 1ª brotación. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 200-300 kg/ha
Frutales	En riego a manta en 1ª brotación. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 200-300 kg/ha
Hortícolas	Como nutriente orgánico de fondo antes de la plantación preferentemente concentrando en la zona de desarrollo radicular.	Radicar: 300-500 kg/ha
Vid	Aplicar a finales de invierno o principios de primavera.	Radicar: 150-250 kg/ha
Tropicales	En riego a manta en 1ª brotación y engorde. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 200-300 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Como nutriente orgánico de fondo antes de la plantación preferentemente concentrando en la zona de desarrollo radicular.	Radicar: 300-500 kg/ha
Olivo	En secano a finales de invierno o primeros de primavera. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Árboles grandes Radicar: 1,5-2 kg/pie
Café	En riego a manta en 1ª brotación. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 200-300 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Este producto se puede aplicar con cualquier tipo mecánico con los que tradicionalmente se aplican los nutrientes minerales. Mantener el producto en lugar seco y aireado. Aunque para su descomposición no es necesario incorporarlo al subsuelo se aconseja una labor a continuación de la aplicación o aplicarlo con máquina incorporadora.

REACH: 01-2119484861-29-0023



HUMUSPOWER PLUS

ABONO NITROGENADO N 20 CON ÁCIDOS HÚMICOS

HUMUSPOWER PLUS es una innovadora fórmula de origen vegetal, compuesta por leonardita procedente de lignitos oxidados durante millones de años, sales potásicas totalmente solubles y nitrógeno de liberación controlada.

Desbloqueo de los nutrientes presentes en el suelo. Evita el lavado del nitrógeno por lixiviación. Produce aumento de la masa radicular y activa la micro flora del suelo. Mejora la estructura del suelo y es el sustituto perfecto del estercolado, además no produce malas hierbas.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	20,00 % m/m
Nitrógeno (N) Amoniacal	20,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	1,00 % m/m
Extracto Húmico Total	8,75 % m/m
Ácidos Húmicos	8,12 % m/m
Ácidos Fúlvicos	0,63 % m/m

pH: 7,25 (10 % disolución)

Este producto, por su procedencia, contiene un 8,75 % de materia orgánica y un 52,50 % de Trióxido de Azufre (SO₃) soluble en agua.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En riego a manta en 1ª brotación. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 300-400 kg/ha
Frutales	En riego a manta en 1ª brotación. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 300-400 kg/ha
Hortícolas	Como nutriente orgánico de fondo antes de la plantación preferentemente concentrando en la zona de desarrollo radicular.	Radicar: 400-600 kg/ha
Vid	Aplicar a finales de invierno o principios de primavera.	Radicar: 250-350 kg/ha
Tropicales	En riego a manta en 1ª brotación y engorde. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 300-400 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Como nutriente orgánico de fondo antes de la plantación preferentemente concentrando en la zona de desarrollo radicular.	Radicar: 400-600 kg/ha
Olivo	En secano a finales de invierno o primeros de primavera. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Árboles grandes Radicar: 2-3 kg/pie
Café	En riego a manta en 1ª brotación. En riego localizado con las lluvias de invierno o en la zona de riego.	Radicar: 300-400 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Este producto se puede aplicar con cualquier tipo mecánico con los que tradicionalmente se aplican los nutrientes minerales. Mantener el producto en lugar seco y aireado. Aunque para su descomposición no es necesario incorporarlo al subsuelo se aconseja una labor a continuación de la aplicación o aplicarlo con máquina incorporadora.

REACH: 01-2119484861-29-0023

AGROCÉ HÚMICO WSP

ÁCIDOS HÚMICOS

AGROCÉ HÚMICO WSP es un concentrado de ácidos húmicos en forma sólida y totalmente soluble, que incorpora al suelo, la sustancia más importante y biológicamente activa entre los productos resultantes de la descomposición de la materia orgánica: "Los ácidos húmicos". Aporta características únicas que hacen de él un elemento indispensable para todo programa de fertirrigación, ayudando a desbloquear los elementos fertilizantes bloqueados en el suelo y mejorando de forma notable la nutrición radicular.

CONTENIDO DECLARADO

Extracto Húmico Total	70,00 % m/m
Ácidos Húmicos	60,00 % m/m
Ácidos Fúlvicos	10,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	12,00-15,00 % m/m
pH: 8-11 (10 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Al arranque vegetativo, a la caída de los pétalos, durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 1-3 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-20 kg/ha
Frutales	Al arranque vegetativo, a la caída de los pétalos, durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 1-3 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-20 kg/ha
Hortícolas	A partir de los primeros riegos, para desarrollar el bulbo radicular y fortalecer la vegetación. Durante el ciclo de cultivo, intensificando en momentos de estrés.	Radicular: 1-3 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-20 kg/ha
Vid	Al arranque vegetativo y en inicio de engorde.	Radicular: 5-8 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-16 kg/ha
Plátanos	Repartir las dosis durante el ciclo vegetativo reforzando en momentos de máximo crecimiento.	Radicular: 1-4 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-25 kg/ha
Tropicales	Al arranque vegetativo, a la caída de los pétalos, durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 1-3 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-20 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	A partir de los primeros riegos, para desarrollar el bulbo radicular y fortalecer la vegetación. Durante el ciclo de cultivo, intensificando en momentos de estrés.	Radicular: 1-3 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-18 kg/ha
Viveros Ornamentales	A partir de los primeros riegos, para desarrollar el bulbo radicular y fortalecer la vegetación. Durante el ciclo de cultivo, intensificando en momentos de estrés.	Radicular: 1-3 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-15 kg/ha
Olivo	Al inicio de la vegetación y en inicio de engorde.	Radicular: 5-8 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-16 kg/ha
Café	Al arranque vegetativo, a la caída de los pétalos, durante la maduración del fruto, hasta 15 días antes de recolección.	Radicular: 1-3 kg/ha por aplicación Dosis total: 6-20 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto para aplicación radicular por riego o inyección directa. Por sus condiciones químicas se recomienda mezclar sólo con correctores de hierro, magnesio, zinc o manganeso, no mezclar con fitosanitarios. Para una buena aplicación es necesario disolver el producto antes de incorporar al tanque de abonado agitándolo intensamente hasta conseguir que los granos se hidraten y se disuelvan perfectamente sin dejar partículas en suspensión. No mezclar con productos de pH ácido, ni con nitrato de calcio ni con aceites derivados del petróleo.

REACH: 01-2119484861-29-0023



AGROCÉ HUMIFER

QUELATO DE HIERRO (Fe) EDDHA CON ÁCIDOS HÚMICOS

AGROCÉ HUMIFER es un producto que combina ácidos húmicos de origen vegetal, "Leonardita" procedente de lignitos oxidados durante millones de años y sales potásicas totalmente solubles con quelato de Hierro (Fe) EDDHA. El proceso de síntesis del producto, garantiza un proceso sinérgico, que aumenta los beneficios que aportan ambos compuestos por separado, con una acción más rápida y prolongada. Mejora la masa radicular de la planta, aumentando la superficie de absorción y como consecuencia mejorando el rendimiento de la fertilización, aporta hierro totalmente quelado, que previene y corrige las carencias de este elemento.

CONTENIDO DECLARADO

Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDDHA	4,00 % m/m
Extracto Húmico Total	23,80 % m/m
Ácidos Húmicos	20,40 % m/m
Ácidos Fúlvicos	3,40 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	4,08-5,10 % m/m
pH: 9-11 (10 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos y Frutales de Hueso y Pepita	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 20-60 g por planta
Viveros de Leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 2-5 g/m ²
Plantones y Jóvenes Leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 3-15 g por planta
Hortícolas	Durante el ciclo vegetativo y en carencia manifiesta.	Radicular: 0,5-1,5 g/m ²
Vid	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 3-10 g por planta
Plátanos	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 3-12 g por planta
Tropicales	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 20-60 g por planta
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 0,5-2 g/m ²
Viveros Ornamentales	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 2-5 g/m ²
Olivo	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 10-40 g por planta
Café	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 3-10 g por planta
Fresa	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 0,5-2 g por planta

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

No mezclar con productos de pH ácido, ni con nitrato de calcio, ni con aceites derivados del petróleo.

AGROCÉ CALCISAN

SOLUCIÓN DE CALCIO (Ca) (10) COMPLEJADO CON ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO

AGROCÉ CALCISAN es un corrector de carencias de calcio quelado por una combinación exclusiva de varios ácidos orgánicos, formulados en proporciones óptimas para lograr su alta eficacia.

Todos ellos se caracterizan por su alta eficacia, al tener un bajo peso molecular y una alta relación entre los grupos carboxilos y alcoholes de las moléculas y el tamaño de éstas.

AGROCÉ CALCISAN nos ayuda a combatir la salinidad del agua y los suelos salino-sódicos, mediante su aporte de calcio quelado y la reacción continua sobre el suelo de sus ácidos orgánicos para liberar el calcio.

Desplaza el sodio absorbido por las arcillas, sustituyéndolo por calcio, con lo que evita la salinización sódica del suelo y la destrucción de la estructura del suelo.

CONTENIDO DECLARADO

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	10,00 % m/m
---------------------------------------	-------------

Óxido de Calcio (CaO) complejado	10,00 % m/m
----------------------------------	-------------

Agente complejante: Ácido lignosulfónico

pH: 3-5 / Densidad: 1,25-1,35 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 17 % de materia orgánica y un 24 % de ácidos polihidroxicarboxílicos.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Frutales, Cítricos y Tropicales	Una primera aplicación con dosis alta y a continuación dosis de mantenimiento cada 8-15 días durante el cultivo.	Plantación: 1-2 cc/planta Planta media: 4-6 L/ha Planta adulta: 5-10 L/ha
Hortícolas y Frutas del bosque (Fresas, frambuesas...)	Una primera aplicación con dosis alta y a continuación dosis de mantenimiento cada 8-15 días durante el cultivo.	Plantación: 1-2 cc/planta Planta media: 3-6 L/ha Planta adulta: 5-10 L/ha
Vid	Una primera aplicación con dosis alta y a continuación dosis de mantenimiento cada 8-15 días durante el cultivo.	Plantación: 1-2 cc/planta Planta media: 3-6 L/ha Planta adulta: 5-10 L/ha
Plátanos	Una primera aplicación con dosis alta y a continuación dosis de mantenimiento cada 8-15 días durante el cultivo.	Plantación: 1-2 cc/planta Planta media: 4-6 L/ha Planta adulta: 5-10 L/ha
Viveros Ornamentales	Una primera aplicación con dosis alta y a continuación dosis de mantenimiento cada 8-15 días durante el cultivo.	Plantación: 1-2 cc/planta Planta media: 3-6 L/ha
Olivo	Una primera aplicación con dosis alta y a continuación dosis de mantenimiento cada 8-15 días durante el cultivo.	Plantación: 1-2 cc/planta Planta media: 4-6 L/ha Planta adulta: 5-10 L/ha
Café	Una primera aplicación con dosis alta y a continuación dosis de mantenimiento cada 8-15 días durante el cultivo.	Plantación: 1-2 cc/planta Planta media: 4-6 L/ha Planta adulta: 5-10 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

En concentraciones altas de salinidad hacer una aplicación de 20 litros por ha. y a los 8 días empezar la aplicación de mantenimiento.

Es muy recomendable en riegos alternos la aplicación de **AGROCÉ ÁCIDOS HÚMICOS**.



C-ACTIV-PLUS

ABONO CON AMINOÁCIDOS

C-ACTIV-PLUS es un producto de alta tecnología que estimula de forma explosiva el número de raíces secundarias en los cultivos y fortalece el sistema defensivo de la planta. En cualquier situación de estrés que tengamos un cultivo la rápida fuerza del producto hará que la planta se estimule en un cortísimo periodo de tiempo. Toda planta con un buen sistema radicular está mucho más fuerte a cualquier ataque de hongos o insectos. Un mayor sistema radicular favorece la asimilación de los nutrientes del suelo.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	0,60 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	0,60 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	7,00 % m/m
Extracto Húmico Total	63,00 % m/m
Ácidos Húmicos	9,00 % m/m
Ácidos Fúlvicos	54,00 % m/m
Aminoácidos libres	4,00 % m/m

pH: 3-5 (10 % disolución)

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido aspártico: 0,29, Alanina: 0,19, Cisteína: 0,10, Glicina: 0,35, Isoleucina: 0,19, Lisina: 0,07, Prolina: 0,44, Tirosina: 0,04, Valina: 0,33, Ácido glutámico: 0,44, Arginina: 0,28, Fenilalanina: 0,21, Histidina: 0,03, Leucina: 0,32, Metionina: 0,02, Serina: 0,51, Treonina: 0,19.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en inicio de brotación, principalmente en plántones, plantas agotadas o afectadas por algún tipo de estrés.	Radicular: 1-2 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una
Frutales	Aplicar en inicio de brotación, principalmente en plántones, plantas agotadas o afectadas por algún tipo de estrés.	Radicular: 1-2 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una
Hortícolas	En inicio de crecimiento y en los momentos de máxima necesidad de las plantas.	Radicular: 1-3 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una
Vid	Aplicar en inicio de brotación principalmente en plántones, plantas agotadas o afectadas por algún tipo de estrés.	Radicular: 1-2 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una
Plátanos	Aplicar en inicio de brotación principalmente en plántones, plantas agotadas o afectadas por algún tipo de estrés.	Radicular: 1-3 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una
Trópicos	Aplicar en inicio de brotación principalmente en plántones, plantas agotadas o afectadas por algún tipo de estrés.	Radicular: 1-2 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En inicio de crecimiento y en los momentos de máxima necesidad de las plantas.	Radicular: 1-3 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una
Viveros Ornamentales	En inicio de crecimiento y en los momentos de máxima necesidad de las plantas.	Radicular: 1-3 aplicaciones 5-6 kg/ha cada una

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Hacer disolución previa. Iniciar la aplicación en la segunda parte del riego. Guardar el producto en sitio fresco y aireado. Mantener los envases cerrados.



La familia de **Micronutrición de Precisión** está compuesta por formulaciones avanzadas que contienen micronutrientes y elementos secundarios quelados con moléculas orgánicas de alta eficiencia. Su función es prevenir y corregir deficiencias nutricionales, optimizando la asimilación de estos elementos esenciales en los cultivos.

Una nutrición equilibrada, que incluya macronutrientes, elementos secundarios y micronutrientes en las proporciones adecuadas, es clave para maximizar el metabolismo vegetal, potenciar el desarrollo radicular y foliar, y asegurar el máximo rendimiento productivo con altos estándares de calidad.

**3**

MICRONUTRICIÓN DE PRECISIÓN

AGROCÉ BORO
AGROCÉ BORMI
AGROCÉ CALCIO 10
AGROCÉ CALCIO + AA
AGROCÉ CALIBOR
AGROCÉ Fe EDDHA
AGROCÉ Fe-L
AGROCÉ NUTRICE HIERRO
AGROCÉ MAGNESIO
AGROCÉ MAGNESIO + AA
AGROCÉ MANGANESO
AGROCÉ NUTRICE MANGANESO
AGROCÉ ZINC
AGROCÉ NUTRICE ZINC
AGROCÉ BOROPLUS MAGNESIO
AGROCÉ BOROPLUS Mg-Zn
AGROCÉ NUTRICE N+C+M
AGROCÉ CORRIGE + 3
AGROCÉ Zn+Mn MAXI
AGROCÉ Zn+Mn RADICULAR
AGROCÉ MIX Q-7
AGROCÉ MIXLAND
AGROCÉ MIXTRAL
AGROCÉ MIX Q-6

AGROCÉ BORO

BORO ETANOLAMINA

AGROCÉ BORO es un fertilizante "boratado" en solución para aplicación foliar. Previene y corrige las fisiopatías de este elemento. Normalmente estas fisiopatías se suelen producir en suelos ligeros y con drenaje o por el contrario en suelos calcáreos, en momentos de sequía o lluvia prolongada.

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B) soluble en agua	11,00 % m/m
pH: 7,5-8,5 / Densidad: 1,30-1,35 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Frutales	Para evitar el acorchado (bitter pit), agrietado y el chancro papiráceo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Vid	Para mejorar la floración y evitar el corrimiento del racimo, evitar frutos pequeños y arrugados, durante el ciclo vegetativo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Antes y después de la floración.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 cc/hl Radicar: 2-3 cc/m ²
Olivo	Merma de producción, hoja de color tabaco y aceitunas deformadas (cara de mono), secado de ramas.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	1 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. La dosis general en extensivo será de 2-4 L/ha. , y en el resto de cultivos, de 2-3 L/ha. Respetar las dosis indicadas.



AGROCÉ BORMI

BORO ETANOLAMINA CON AMINOÁCIDOS

AGROCÉ BORMI es una mezcla de boro en forma monoetanolamina con aminoácido que mejora la absorción de este micronutriente por el tejido, influyendo sobre varios de los procesos bioquímicos y fisiológicos de la planta. El nivel de boro óptimo en el tejido vegetal permite mejorar la viabilidad del polen influyendo directamente sobre la floración. En la fase de crecimiento de frutos, el boro interviene en el mejoramiento de la elasticidad del tejido evitando la formación de rajaduras y en la maduración del mismo, favorece la translocación de azúcares de hojas hacia frutos aumentando el rendimiento de estos.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	3,00 % m/m
Nitrógeno (N) Total	2,81 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	2,64 % m/m
Boro (B) soluble en agua	7,00 % m/m
pH: 7,5-8,5 / Densidad: 1,28 g/cc	

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,21, Ácido Glutámico: 0,32, Alanina: 0,11, Arginina: 0,15, Cisteína: 0,08, Fenilalanina: 0,11, Glicina: 0,49, Isoleucina: 0,09, Histidina: 0,07, Leucina: 0,20, Lisina: 0,10, Prolina: 0,33, Serina: 0,32, Tirosina: 0,03, Treonina: 0,27, Valina: 0,12.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Frutales	Para evitar el acorchado (bitter pit), agrietado y el chancro papiráceo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Vid	Para mejorar la floración y evitar el corrimiento del racimo, evitar frutos pequeños y arrugados, durante el ciclo vegetativo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Antes y después de la floración.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 cc/hl Radicar: 2-3 cc/m ²
Olivo	Merma de producción, hoja de color tabaco y aceitunas deformadas (cara de mono), secado de ramas. En primavera.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl Extra: 500-600 cc/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	1 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. La dosis general en extensivo será de 2-4 L/ha., y en el resto de cultivos de 2-3 L/ha. Respetar las dosis indicadas.

AGROCÉ CALCIO 10

SOLUCIÓN NITROGENADA N6 CON CALCIO (Ca) (10)

AGROCÉ CALCIO 10 es un corrector de carencias de calcio, que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación) para combatir y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia de calcio. Va a contribuir al perfecto desarrollo de la planta, cubriendo las necesidades en calcio indispensables para conseguir un cultivo de primera calidad. Estabiliza y fortalece las paredes celulares para impedir la degradación de los tejidos cuando se inicia la madurez.

La deficiencia se observa en las zonas de crecimiento y en las hojas jóvenes. Estas se vuelven deformes y cloróticas y, en estados más avanzados de deficiencia, aparece necrosis en los márgenes de las hojas. Los tejidos afectados se vuelven blandos, debido a la disolución de las paredes celulares, aparecen sustancias marrones que se acumulan en los espacios intercelulares.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	6,00 % m/m
Nitrógeno (N) Nítrico	6,00 % m/m
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	10,00 % m/m

pH: 1-2 / Densidad: 1,22-1,26 g/cc

Este producto contiene LEBBINA como mejorador de los principios activos.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En preventivo al inicio del verano para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha
Frutales	En preventivo al inicio del verano para prevenir el bitter-pit en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-40 L/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha
Frambuesas, Frutos del bosque, etc.	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicar: 2-3 cc/m ²
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.



AGROCÉ CALCIO + AA

SOLUCIÓN NITROGENADA N 7,8 CON CALCIO (Ca) (9,5) CON AMINOÁCIDOS

AGROCÉ CALCIO + AA es un corrector de carencias de calcio, para combatir y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia de calcio (Ca). Contiene aminoácidos esenciales, que facilitan y mejoran la absorción del calcio. Va a contribuir al perfecto desarrollo de la planta, cubriendo las necesidades en calcio indispensables para conseguir un cultivo de primera calidad. Estabiliza y fortalece las paredes celulares para impedir la degradación de los tejidos cuando se inicia la madurez. La deficiencia se observa en las zonas de crecimiento y en las hojas jóvenes. Estas se vuelven deformes y cloróticas y, en estados más avanzados de deficiencia, aparece necrosis en los márgenes de las hojas. Los tejidos afectados se vuelven blandos, debido a la disolución de las paredes celulares, aparecen sustancias marrones que se acumulan en los espacios intercelulares.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	7,80 % m/m
Nitrógeno (N) Nítrico	6,40 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	1,00 % m/m
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	9,50 % m/m
Aminoácidos libres	4,60 % m/m

pH: 3-4 / Densidad: 1,28-1,32 g/cc

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,46, Ácido Glutámico: 1,13, Serina: 0,25, Histidina: 0,24, Glicina: 0,27, Treonina: 0,07, Arginina: 0,33, Alanina: 0,33, Tirosina: 0,075, Valina: 0,24, Metionina: 0,06, Isoleucina: 0,05, Fenilalanina: 0,26, Leucina: 0,20, Lisina: 0,33, Hidroxiprolina: 0,08, Prolina: 0,23.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-36 L/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicar: 2-3 cc/m ²
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

AGROCÉ CALIBOR

SOLUCIÓN DE CALCIO (Ca) (10) CON BORO (B)

AGROCÉ CALIBOR es un corrector de carencias de calcio y boro, que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación) para combatir y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia de Calcio (Ca)/Boro (B). Mejora el cuajado de frutos. El boro favorece la rápida asimilación del calcio para trasladar a éste a los órganos más jóvenes del cultivo.

CONTENIDO DECLARADO

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	10,00 % m/m
Boro (B) soluble en agua	1,00 % m/m

pH: 3,5-4,5 / Densidad: 1,30-1,35 g/cc

Este producto contiene LEBBINA como mejorador de los principios activos.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En preventivo al inicio del verano para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutales	En preventivo al inicio del verano para prevenir el bitter-pit en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-40 L/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frambuesas Frutos del bosque, , etc.	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m ²
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

Fe 4,8

Fe 3,2

Fe 2,0

AGROCÉ Fe EDDHA

QUELATO DE HIERRO (Fe) EDDHA

AGROCÉ Fe-EDDHA es una fórmula granulada y micronizada WSP totalmente soluble de elevadísima pureza. Está especialmente indicado como corrector de clorosis férrica, deficiencias de hierro, para suelos alcalinos en riego por goteo o cualquier otro sistema.

AGROCÉ Fe-EDDHA resulta eficaz en todo tipo de cultivos como frutales horticolas, florales, tropicales y ornamentales. El mismo contenido en hierro pero con diferentes contenidos en orto-orto depende de la alcalinidad del suelo en que se encuentre nuestro cultivo. A mayor pH del suelo el contenido en el isómero orto-orto debe ser mayor.

CONTENIDO DECLARADO

	Fe 4,8	Fe 3,2	Fe 2,0
Hierro (Fe) soluble en agua	6,00 % m/m	6,00 % m/m	6,00 % m/m
Hierro (Fe) quelado por EDDHA	6,00 % m/m	6,00 % m/m	6,00 % m/m
Hierro (Fe) quelado por EDDHA (isómero orto-orto)	4,80 % m/m	3,20 % m/m	2,00 % m/m

pH: 8-9 (10 % disolución)

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos y Frutales de hueso y pepita	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 20-60 g por planta
Viveros de leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 2-5 g/m ²
Plantones y Jóvenes leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 3-15 g por planta
Horticolas	Durante el ciclo vegetativo y en carencia manifiesta.	Radicar: 0,5-1,5 g/m ²
Vid	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 3-10 g por planta
Plátanos	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 3-12 g por planta
Tropicales	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 20-60 g por planta
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 0,5-2 g/m ²
Viveros Ornamentales	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 2-5 g/m ²
Olivo	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 10-40 g por planta
Café	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 3-10 g por planta
Fresa	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicar: 0,5-2 g por planta

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Por sus condiciones físico-químicas el producto se puede aplicar en todo tipo de sistemas de riego como en inyección directa. Es recomendable realizar una predilución para que se hidrate el producto perfectamente. Si se realiza este paso se aplicará lo antes posible. En caso de aplicación directa hacer un riego a continuación de la inyección. Para obtener una mayor efectividad del producto en eficacia y durabilidad es muy recomendable aplicarlo junto a **AGROCÉ ÁCIDOS HÚMICOS**.

AGROCÉ Fe-L

SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE HIERRO (Fe) PROCEDENTE DE SULFATO

AGROCÉ Fe-L es un corrector de carencias de hierro (Fe), en forma líquida para aplicación foliar. Contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación), lo que permite que el hierro sea asimilado foliarmente por el cultivo y eliminemos la carencia de forma inmediata.

CONTENIDO DECLARADO

Hierro (Fe) soluble en agua	7,00 % m/m
-----------------------------	------------

pH: 3-4 / Densidad: 1,20-1,25 g/cc

Este producto contiene LEBBINA como mejorador de los principios activos.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos y Frutales de hueso y pepita	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Viveros de leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Hortícolas	Durante el ciclo vegetativo en preventivo y en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Vid	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Plátanos	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Tropicales	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Viveros Ornamentales	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Olivo	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl
Café	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500-750 cc/hl

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2 a 3 L/ha. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

AGROCÉ NUTRICE HIERRO

QUELATO DE HIERRO (Fe) EDTA

AGROCÉ NUTRICE HIERRO es un corrector sólido quelado con EDTA, para combatir y prevenir carencias de Hierro (Fe). Se puede aplicar por vía foliar y radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en un intervalo de estabilidad entre 4-7,5.

CONTENIDO DECLARADO

Hierro (Fe) soluble en agua	13,00 % m/m
Hierro (Fe) quelado EDTA	13,00 % m/m
pH: 4-5 (1 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de la primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de la primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 kg/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de la primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Durante todo el ciclo vegetativo preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Viveros Ornamentales	Durante todo el ciclo vegetativo preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m ²
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de la primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto con temperaturas superiores a 25 grados centígrados.

AGROCÉ MAGNESIO

SOLUCIÓN DE MAGNESIO (Mg) (6) COMPLEJADO POR ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO

AGROCÉ MAGNESIO está formulado para ser aplicado en toda clase de cultivos que tengan o presentan necesidades de magnesio. Por su composición puede ser aplicado por vía foliar o por fertirrigación. Facilita la absorción y transporte de otros elementos, como el fósforo, en momentos determinados e importantes del cultivo. No hay que olvidar que el magnesio es uno de los principales componentes de la clorofila.

CONTENIDO DECLARADO

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	6,00 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) complejado	6,00 % m/m

Agente complejante: Ácido lignosulfónico

pH: 2-4 / Densidad: 1,20-1,25 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 5 % de materia orgánica.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha
Frutales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo antes o después de la floración.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-40 L/ha
Tropicales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicar: 2-3 cc/m ²
Olivo	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Café	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicar: 12-30 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.



AGROCÉ MAGNESIO + AA

SOLUCIÓN NITROGENADA N 8.8 CON MAGNESIO (Mg) (10) Y CON AMINOÁCIDOS

AGROCÉ MAGNESIO + AA es un corrector de Magnesio (Mg) especialmente preparado para dar buenos resultados en todo tipo de cultivos. Es una formulación formada por aminoácidos que complejan el magnesio. El proceso de formación de los complejos orgánicos metálicos es análogo a aquellos que se forman en la naturaleza entre los aminoácidos y los iones de magnesio.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	8,85 % m/m
Nitrógeno (N) Nítrico	7,00 % m/m
Nitrógeno (N) Orgánico	1,20 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	10,00 % m/m
Aminoácidos libres	6,00 % m/m

pH: 4-5 / Densidad: 1,28-1,33 g/cc

AMINOGRAMA % (m/m)

Ácido Aspártico: 0,59, Ácido Glutámico: 1,47, Serina: 0,32, Histidina: 0,31, Glicina: 0,35, Treonina: 0,09, Arginina: 0,43, Alanina: 0,43, Tirosina: 0,10, Valina: 0,31, Metionina: 0,08, Isoleucina: 0,06, Fenilalanina: 0,36, Leucina: 0,27, Lisina: 0,43, Hidroxiprolina: 0,10, Prolina: 0,30.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo antes o después de la floración.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-40 L/ha
Tropicales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m ²
Olivo	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Café	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Este producto permite su mezcla con la mayoría de los productos fitosanitarios, no obstante se recomienda realizar una comprobación previa.

AGROCÉ MANGANESO

SOLUCIÓN DE MANGANESO (Mn) COMPLEJADO POR ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO

AGROCÉ MANGANESO es un corrector líquido “complejado” con lignosulfonato, para combatir y prevenir carencias de Manganeso (Mn).

CONTENIDO DECLARADO

Manganeso (Mn) soluble en agua	8,00 % m/m
Manganeso (Mn) complejado	8,00 % m/m

Agente complejante: Ácido lignosulfónico
pH: 6-7 / Densidad: 1,32-1,35 g/cc

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/ha
Vid	Aplicar antes y después de la floración tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m ²
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/ha
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. En el tanque de abonado se puede mezclar con los NPK compuestos o simples menos con el ácido fosfórico. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación radicular para potenciar aún más el efecto se puede mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.



AGROCÉ NUTRICE MANGANESO

QUELATO DE MANGANESO (Mn) EDTA

AGROCÉ NUTRICE MANGANESO es un corrector sólido quelado con EDTA, para combatir y prevenir carencias de Manganese (Mn). Se puede aplicar por vía foliar y radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en un intervalo de pH entre 4-6,5.

CONTENIDO DECLARADO

Manganese (Mn) soluble en agua	13,00 % m/m
Manganese (Mn) EDTA quelado	13,00 % m/m

Agente quelante: EDTA
pH: 6-7 (10 % disolución)

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 kg/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m ²
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Aunque se puede utilizar en aplicación foliar este producto está también preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto con temperaturas superiores a 25 grados centígrados.

AGROCÉ ZINC

SOLUCIÓN DE ZINC (Zn) COMPLEJADO POR ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO

AGROCÉ ZINC es un corrector líquido complejoado con lignosulfonato, para combatir y prevenir carencias de Zinc (Zn).

CONTENIDO DECLARADO

Zinc (Zn) soluble en agua	8,00 % m/m
Zinc (Zn) complejoado	8,00 % m/m
Agente complejante: Ácido lignosulfónico	
pH: 6-7 / Densidad: 1,32-1,35 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-25 L/ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-25 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-20 L/ha
Vid	Aplicar antes y después de la floración tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-25 L/ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-25 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifestadas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-25 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicar: 2-3 cc/m ²
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-25 L/ha
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-25 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. En el tanque de abonado se puede mezclar con los NPK compuestos o simples menos con el ácido fosfórico. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación radicular, para potenciar aún más el efecto, se puede mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.



AGROCÉ NUTRICE ZINC

QUELATO DE ZINC (Zn) EDTA

AGROCÉ NUTRICE ZINC es un corrector sólido quelado con EDTA, para combatir y prevenir carencias de zinc (Zn). Se puede aplicar por vía foliar y radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en un intervalo de pH entre 4-7,5.

CONTENIDO DECLARADO

Zinc (Zn) soluble en agua	15,00 % m/m
Zinc (Zn) EDTA quelado	15,00 % m/m
Agente quelante: EDTA	
pH: 7-8 (10 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 6-12 kg/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 6-12 kg/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicar: 4-8 kg/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 6-12 kg/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 6-12 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 6-12 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 6-12 kg/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicar: 2-3 g/m ²
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 6-12 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Aunque se puede utilizar en aplicación foliar este producto está también preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados centígrados.

AGROCÉ BOROPLUS MAGNESIO

MAGNESIO (Mg) (11) COMPLEJADO POR ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO Y CON BORO (B)

AGROCÉ BOROPLUS MAGNESIO es una mezcla sólida de boro y magnesio totalmente soluble y preparada para ser asimilada por la planta. El boro es un elemento fundamental en el cuaje del fruto y el magnesio es el componente principal de la clorofila. La unión de ambos elementos ayuda a la formación del fruto. Su aplicación será desde arranque vegetativo del cultivo hasta cuajado, poniendo así el cultivo en condiciones para obtener un mayor número de frutos.

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B) soluble en agua	11,00 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	11,00 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) complejoado	11,00 % m/m
Agente complejante: Ácido lignosulfónico	
pH: 5-6 (10 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutales	En prefloración, con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Vid	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Antes y después de la floración.	Foliar: 150-250 g/hl
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 g/hl
Olivo	En preventivo al inicio de brotación, curativo en cualquier ciclo del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	Foliar: 1 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Respetar las dosis indicadas.



AGROCÉ BOROPLUS Mg-Zn

MAGNESIO (Mg) (5), BORO (B) Y ZINC (Zn) COMPLEJADOS POR ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO

AGROCÉ BOROPLUS Mg-Zn es una mezcla sólida de boro, magnesio y zinc totalmente soluble y preparada para ser asimilada por la planta. El boro es un elemento fundamental en el cuaje del fruto y el magnesio es el componente principal de la clorofila. La unión de ambos elementos ayuda a la formación del fruto. El zinc es fundamental en el metabolismo, participando en la formación de la clorofila, de las auxinas y de las hormonas de crecimiento. Destacamos la riqueza en azufre para realizar una completa nutrición. Su aplicación será desde arranque vegetativo del cultivo hasta cuajado, poniendo así el cultivo en condiciones para obtener un mayor número de frutos.

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B) soluble en agua	8,00 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua y complejoado	5,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y complejoado	5,00 % m/m

Agente complejante: Ácido lignosulfónico
pH: 5-6 (5 % disolución)

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutales	En prefloración, con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Vid	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Plátanos	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de llenado de frutos.	Foliar: 250-350 g/hl Dosis general: 2-3 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Antes y después de la floración.	Foliar: 150-250 g/hl
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 g/hl
Olivo	En preventivo al inicio de brotación, curativo en cualquier ciclo del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	Foliar: 1 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Respetar las dosis indicadas.

AGROCÉ NUTRICE N+C+M

SOLUCIÓN NITROGENADA N10 CON CALCIO (Ca) (11) Y MAGNESIO (Mg) (5)

AGROCÉ NUTRICE N+C+M es un corrector de calcio, magnesio reforzado con nitrógeno orientado a los cultivos con grandes exigencias de estos elementos. El calcio ejerce un papel fundamental en la planta. Forma parte activa de hojas, tallos, raíces y frutos. Es responsable de la rigidez de las paredes celulares. El magnesio juega un papel fundamental en la fotosíntesis, por ser parte constituyente de la clorofila, que influye sobre la fructificación o cuaje de frutos. Mejora los brotes, haciendo que el crecimiento sea equilibrado y consistente preparando al cultivo para un mayor desarrollo.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	10,00 % m/m
Nitrógeno (N) Nitrato	10,00 % m/m
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	11,00 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	5,00 % m/m
pH: 1-2 / Densidad: 1,35-1,45 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En preventivo al inicio del verano para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicar: 12-40 L/ha
Frutales	En preventivo al inicio del verano para prevenir el bitter-pit en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicar: 12-40 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 300-350 cc/hl General: 3-4 L/ha cada aplicación Radicar: 12-40 L/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicar: 12-40 L/ha
Frambuesas, Frutos del bosque, etc.	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el "rajado" en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 300-350 cc/hl General: 3-4 L/ha cada aplicación Radicar: 12-40 L/ha
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicar: 12-40 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicar: 12-40 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 3-4 L/ha., en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis general. No mezclar con sulfatos y fosfatos. Para futuras moléculas de fitosanitarios hacer prueba antes de la mezcla o consultar al departamento técnico.



AGROCÉ CORRIGE + 3

SOLUCIÓN DE MAGNESIO (Mg) (2,5) CON MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn) COMPLEJADOS POR ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO

AGROCÉ CORRIGE + 3 es un producto desarrollado para su aplicación preventiva y curativa mediante pulverizaciones foliares, tanto en cultivos herbáceos o leñosos. Complejo orgánico como corrector triple de zinc, manganeso y magnesio. Aplicado correctamente y en las dosis adecuadas produce un incremento notable en los niveles nutricionales.

CONTENIDO DECLARADO

Manganeso (Mn) soluble en agua y complejoado	2,50 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua y complejoado	2,50 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y complejoado	2,50 % m/m
Agente complejante: Ácido lignosulfónico	
pH: 3-5 / Densidad: 1,25-1,30 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación
Vid	Aplicar antes y después de la floración tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/ha
Plátanos	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de llenado de frutos.	Foliar: 250-350 cc/hl Dosis general: 2-3 L/ha Radicular: 5-10 L/ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m ²
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación.

AGROCÉ Zn+Mn MAXI

MEZCLA LÍQUIDA DE MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn) PROCEDENTES DE SULFATOS

AGROCÉ Zn+Mn MAXI es un corrector concentrado doble de carencias líquido, que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación), de fácil absorción con efecto de bajada y subida por la savia de las plantas. Producto que por su composición tiene un efecto directo sobre los brotes jóvenes de las plantas, facilitando la fotosíntesis y el desarrollo foliar. Indicado durante todo el ciclo vegetativo, pero especialmente en inicio de brotación cuando la planta necesita un equilibrio óptimo para una buena floración y posterior cuaje de las flores.

CONTENIDO DECLARADO

Manganeso (Mn) soluble en agua	4,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua	7,00 % m/m

pH: 5-6 / Densidad: 1,40-1,50 g/cc

Este producto contiene LEBBINA como mejorador de los principios activos.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-20 L/ha
Vid	Aplicar antes y después de la floración tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicar: 12-20 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicar: 2-3 cc/m ²
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicar: 12-24 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación.



AGROCÉ Zn+Mn RADICULAR

MEZCLA LÍQUIDA DE MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn) QUELADOS POR EDTA

AGROCÉ Zn+Mn RADICULAR es un producto desarrollado para su aplicación preventiva y curativa mediante aplicaciones radiculares, tanto en cultivos herbáceos como leñosos. El zinc es un micronutriente esencial para la activación de procesos enzimáticos, formación de almidón, peptidasas y proteínas. También impide la destrucción de auxinas. El manganeso, micronutriente esencial para la formación de clorofila, es catalizador de reacciones de oxidación-reducción en diversos procesos metabólicos. Es un producto altamente específico para la activación de procesos enzimáticos de la planta y para la formación de proteína.

CONTENIDO DECLARADO

Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	5,00 % m/m
pH: 3-4 / Densidad: 1,25-1,30 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también a primeros de otoño.	Radicular: 10-20 L/ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Radicular: 10-20 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 12-20 L/ha
Vid	Aplicar antes y después de la floración tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.	Radicular: 10-20 L/ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 10-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Radicular: 10-20 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m ²
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 10-20 L/ha
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 10-20 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación. En aplicación radicular se aconseja mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.

AGROCÉ MIX Q-7

SOLUCIÓN DE MAGNESIO (Mg) (6) CON MICRONUTRIENTES

AGROCÉ MIX Q-7 es una mezcla líquida de microelementos que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación), totalmente solubles para ser utilizados tanto por vía radicular como por vía foliar. Los micronutrientes son fundamentales en la nutrición de las plantas aunque son necesarios en pequeñas proporciones. Una carencia de cualquiera de ellos se puede manifestar tardíamente y mientras tanto el cultivo no se ha desarrollado con normalidad. Por tanto es muy necesario realizar tratamientos preventivos y no esperar a que la carencia se manifieste.

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B) soluble en agua	0,30 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua	0,20 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua	1,50 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua	1,00 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,10 % m/m
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	6,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua	0,30 % m/m

pH: 1-3 / Densidad: 1,30-1,35 g/cc

Este producto contiene LEBBINA como mejorador de los principios activos.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación
Vid	Aplicar antes y después de la floración tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/ha
Plátanos	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifestadas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m²
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha., en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación. En aplicación radicular se aconseja mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.



AGROCÉ MIXLAND

MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES QUELADOS POR EDTA Y EDDHA

AGROCÉ MIXLAND es un corrector sólido de carencias múltiples quelado por EDTA y hierro quelado en forma de EDTA y EDDHA, para su aplicación por vía foliar y radicular en suelos neutros o con baja alcalinidad. Su forma química permite que el producto sea absorbido rápidamente por las hojas y raíces según tipo de aplicación.

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B) soluble en agua	0,50 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua	7,00 % m/m
Hierro (Fe) quelado por EDTA	6,50 % m/m
Hierro (Fe) quelado por EDDHA	0,50 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,00 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,20 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50 % m/m
pH: 2,5-3,5 (10 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 kg/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 kg/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 kg/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 kg/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 kg/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m ²
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Aunque se puede aplicar en vía foliar este producto está preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto con temperaturas superiores a 25 grados centígrados. Respetar las dosis indicadas.

AGROCÉ MIXTRAL

MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES QUELADOS POR EDTA

AGROCÉ MIXTRAL es un corrector de carencias múltiples en forma de polvo soluble. El hierro, manganeso, zinc y cobre se encuentran quelados con EDTA lo que garantiza su estabilidad y disponibilidad en un amplio margen de pH. El boro y molibdeno se encuentran en forma mineral totalmente soluble y asimilable por las plantas.

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B) soluble en agua	2,50 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	7,00 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	5,00 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,40 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,00 % m/m
pH: 4-5 (5 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicar: 4-8 kg/ha
Vid	Se puede aplicar en estado preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Plátanos	Se puede aplicar en estado preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en floración.	Radicar: 2-3 g/m ²
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Aunque se puede aplicar por vía foliar, se aconseja su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado a tratamientos fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o haciendo una prueba previa.



AGROCÉ MIX Q-6

MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES QUELADOS POR EDTA

AGROCÉ MIX Q-6 es un corrector de carencias múltiples quelados en forma WSP, para su aplicación por vía foliar y radicular. Al presentarse en forma totalmente quelatada, el cultivo lo aprovecha al máximo porque el agente quelatante protege al ion metálico de posibles bloqueos que pudieran producirse.

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B) soluble en agua	0,50 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	8,00 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,30 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,20 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,75 % m/m
pH: 6-7 (10 % disolución)	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicar: 4-8 kg/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicar: 2-3 g/m ²
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicar: 5-10 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Aunque se puede aplicar en vía foliar este producto está preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto con temperaturas superiores a 25 grados centígrados. Respetar las dosis indicadas.



La familia de **Potenciadores de Calidad y Producción** está diseñada para maximizar el rendimiento y la calidad de la cosecha, asegurando frutos homogéneos y de alto valor comercial. Desde la fase de cuajado, una nutrición específica es esencial para optimizar el desarrollo del fruto, potenciando su crecimiento, firmeza y vida postcosecha.

Estos productos mejoran la disponibilidad y asimilación de nutrientes clave, optimizando parámetros como el contenido de azúcares, color, textura y vida útil, garantizando cultivos con las mejores características organolépticas y una mayor rentabilidad para el productor.



4

POTENCIADORES DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN

AGROCÉ K-33 ACID

AGROCÉ K-44 EXPRESS

AGROCÉ POTASIO K-52

AGROCÉ POTASIO TURBO

AGROCÉ NEUTRAL POTASH

AGROCÉ X-23

AGROCÉ K-33 ACID

SOLUCIÓN POTÁSICA K 23

AGROCÉ K-33 ACID es un nutriente potásico de alta concentración de potasio, fácilmente asimilable por la planta. Está formulado para todos aquellos cultivos que presentan unas elevadas necesidades nutritivas en potasio. Favorece la asimilación de calcio y magnesio, con lo que favorece la corrección de diversas y complejas fisiopatías, como clorosis de la hoja, marchitez apical etc. Ayuda en la síntesis de azúcares y proteínas. Aumenta la resistencia del fruto. Mejora la consistencia celular de la planta. Precursor enzimático con acción sobre el calibre y la producción. Tiene una formulación totalmente exenta de cloruros.

CONTENIDO DECLARADO

Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	23,00 % m/m
pH: 7-8 / Densidad: 1,38-1,42 g/cc	

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 5-20 L/ha
Frutales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 5-20 L/ha
Hortícolas	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 5-20 L/ha
Vid	Hacer 1-2 aplicaciones 10 días después del envero y 40 días antes de la recolección.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Plátanos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Radicar: 10-30 L/ha
Tropicales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 5-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 5-20 L/ha
Olivo	Hacer varias aplicaciones entre Junio y Octubre.	Foliar: 250-400 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 10-20 L/ha
Café	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 5-20 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto preparado para su aplicación foliar y radicular. En aplicación foliar se puede mezclar con la mayoría de fitosanitarios, en caso de duda hacer mezcla previa. En cítricos y frutales es aconsejable aplicar después de caída de pétalos. En viña para vinificación ser muy estrictos en cumplir el plazo de días antes de la recolección para cualquier tipo de potasio.

AGROCÉ K-44 EXPRESS

SOLUCIÓN POTÁSICA K 30

AGROCÉ K-44 EXPRESS es un producto con una elevada concentración de potasio (K_2O) soluble en agua, para aplicar preferentemente vía radicular. La aplicación de materia orgánica con un 2 % de extracto húmico total facilita la asimilación del nutriente evitando que se bloquee. Uno de los problemas en la fase de engorde de los frutos es que las cantidades importantes que se incorporan de nitrato potásico no dan el resultado óptimo en engorde rápido de fruto debido al bloqueo existente del potasio en el suelo. Además, por más cantidad que apliquemos tampoco se obtiene la solución.

AGROCÉ K-44 EXPRESS es un potasio muy asimilable por la raíz y está formulado para que se bloquee lo menos posible y el cultivo engorde y madure al ritmo deseado. En frutales de hueso, la primera aplicación coincide con la fase de formación del hueso.

CONTENIDO DECLARADO

Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua | 30,00 % m/m

pH: 13-14 / Densidad: 1,39-1,41 g/cc

Este producto, por su procedencia, contiene un 8 % de extracto húmico total.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar a partir del 50 % del engorde.	Foliar: 300-500 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 2-3 L/ha
Frutales	Aplicar a partir del 50 % del engorde.	Radicular: 5-20 L/ha
Hortícolas	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Radicular: 5-20 L/ha
Vid	Hacer 1-2 aplicaciones 10 días después del envero y 40 días antes de la recolección.	Radicular: 5-20 L/ha
Plátanos	Repartir la dosis de Agosto a Diciembre.	Radicular: 5-40 L/ha
Tropicales	Aplicar a partir del 50 % del engorde.	Radicular: 5-20 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Radicular: 5-20 L/ha
Olivo	Hacer varias aplicaciones entre Julio y Octubre.	Foliar: 300-500 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 10-20 L/ha
Café	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Radicular: 5-20 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto preparado para su aplicación foliar y radicular en todo tipo de cultivos. En aplicación foliar se puede mezclar con la mayoría de fitosanitarios, en caso de duda hacer mezcla previa. En caso de gran producción se aconseja aumentar la dosis hasta 30-40 L/ha.

En viña para vinificación ser muy estrictos en cumplir el plazo de días antes de la recolección para cualquier tipo de potasio.

AGROCÉ POTASIO K-52

SOLUCIÓN NK 3-32

AGROCÉ POTASIO K-52 es un nutriente potásico (K_2O) soluble en agua, de alta concentración de potasio EDTA, fácilmente asimilable por la planta. El producto está diseñado para todos aquellos cultivos que presentan unas elevadas necesidades nutritivas en potasio. Favorece la asimilación de calcio y magnesio, con lo que favorece la corrección de diversas y complejas fisiopatías, como clorosis de la hoja, marchitez apical etc.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	3,00 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	3,00 % m/m
Óxido de Potasio (K_2O) soluble en agua	32,00 % m/m

pH: 12-14 / Densidad: 1,50-1,52 g/cc
Este producto contiene agente quelante EDTA.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 5-30 L/ha
Frutales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 5-30 L/ha
Hortícolas	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 5-30 L/ha
Vid	Hacer 1-2 aplicaciones 10 días después del envero y 40 días antes de la recolección.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 10-30 L/ha
Plátanos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Radicular: 10-30 L/ha
Tropicales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 5-30 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 5-30 L/ha
Olivo	Hacer varias aplicaciones entre Julio y Octubre.	Foliar: 250-400 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 10-30 L/ha
Café	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 5-30 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto preparado para su aplicación foliar y radicular. En aplicación foliar hacer mezcla previa y utilizar los acondicionadores de pH de nuestro catálogo. En cítricos y frutales es aconsejable aplicar después de la caída de pétalos. En viña para vinificación ser muy estrictos en cumplir el plazo de días antes de la recolección para cualquier tipo de potasio. No aplicar con altas temperaturas.

AGROCÉ POTASIO TURBO

ABONO NK 3-50 CON MICRONUTRIENTES QUELADOS POR EDTA

AGROCÉ POTASIO TURBO posee un contenido del 50 % en potasio soluble en agua, asimilable por vía radicular y foliar. El producto es una formulación particularmente diseñada para todos esos cultivos que presentan unas elevadas necesidades nutritivas en potasio. Favorece la síntesis de azúcares y proteínas. Interviene en la regulación estomática. Aumenta la resistencia del fruto e influye en el volumen de los frutos. Mejora la consistencia celular de la planta.

CONTENIDO DECLARADO

Nitrógeno (N) Total	3,00 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	3,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	50,00 % m/m
Boro (B) soluble en agua	0,01 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,01 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	0,05 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,01 % m/m

pH: 10-11 (10 % disolución)

Este producto, por su procedencia, contiene un 10 % de agente quelante EDTA y un 12 % de Trióxido de Azufre (SO₃) soluble en agua.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 5-20 kg/ha
Frutales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 5-20 kg/ha
Hortícolas	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-300 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 5-20 kg/ha
Vid	Hacer 1-2 aplicaciones 10 días después del envero y 40 días antes de la recolección.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 10-20 kg/ha
Plátanos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Radicular: 10-30 kg/ha
Tropicales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 5-20 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 5-20 kg/ha
Olivo	Hacer varias aplicaciones entre Julio y Octubre.	Foliar: 250-400 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 10-20 kg/ha
Café	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicular: 5-20 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto preparado para su aplicación foliar y radicular. En aplicación foliar se puede mezclar con la mayoría de fitosanitarios, en caso de duda hacer mezcla previa. En cítricos y frutales es aconsejable aplicar después de caída de pétalos. En viña para vinificación ser muy estrictos en cumplir el plazo de días antes de la recolección y para cualquier tipo de potasio.

AGROCÉ NEUTRAL POTASH

ABONO POTÁSICO K (SO₃) 50 (23) CON MICRONUTRIENTES

AGROCÉ NEUTRAL POTASH, con un contenido del 50 % en potasio soluble en agua, asimilable por vía radicular y foliar es una formulación particularmente diseñada para todo cultivo que presente unas elevadas necesidades nutritivas en potasio. Favorece la síntesis de azúcares y proteínas. Interviene en la regulación estomática. Aumenta la resistencia del fruto e influye en el volumen de los frutos. Mejora la consistencia celular de la planta.

CONTENIDO DECLARADO

Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	50,00 % m/m
Boro (B) soluble en agua en forma mineral	0,01 % m/m
Cobre (Cu) soluble en agua	0,01 % m/m
Hierro (Fe) soluble en agua	0,05 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua	0,01 % m/m
Trióxido de Azufre (SO ₃) soluble en agua	23,00 % m/m

pH: 2-3 (5 % disolución)

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicar: 5-20 kg/ha
Frutales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicar: 5-20 kg/ha
Hortícolas	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-300 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicar: 5-20 kg/ha
Vid	Hacer 1-2 aplicaciones 10 días después del envero y 40 días antes de la recolección.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicar: 10-20 kg/ha
Plátanos	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Radicar: 10-30 kg/ha
Tropicales	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicar: 5-20 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Repartir la dosis en cada una de las floraciones en el momento de engorde.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicar: 5-20 kg/ha
Olivo	Hacer varias aplicaciones entre Julio y Octubre.	Foliar: 250-500 g/hl Radicar: 10-20 kg/ha
Café	Reforzar las dosis al inicio y final de engorde repartiendo el resto entre las dos anteriores.	Foliar: 200-350 g/hl General: 2-3 kg/ha Radicar: 5-20 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Producto preparado para su aplicación foliar y radicular. En aplicación foliar se puede mezclar con la mayoría de fitosanitarios, en caso de duda hacer mezcla previa. En cítricos y frutales es aconsejable aplicar después de la caída de pétalos. En viña para vinificación se debe ser muy estrictos en cumplir el plazo de días antes de la recolección para cualquier tipo de potasio.

AGROCÉ X-23

SOLUCIÓN POTÁSICA K6

AGROCÉ X-23 incorpora en sus contenidos y fabricación, una tecnología punta que hace incrementar en los frutos el contenido de azúcares y reduce la acidez lo que favorece una maduración más precoz.

Su principal componente, el activador, hace que aumente la actividad de fotosíntesis en los cultivos, a través del aumento de la biomasa en éstos. Tiene un efecto estimulante, que favorece la máxima asimilación de algunos nutrientes como el magnesio, nitrógeno, fósforo y hierro.

CONTENIDO DECLARADO

Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,00 % m/m
---	------------


pH: 6-7 / Densidad: 1,20 g/cc

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Frutales	1º Tratamiento en caída de pétalos. 2º Tratamiento cuando el fruto tenga un tercio de su tamaño final. 3º Tratamiento en el cambio de color.	1 L/ha cada aplicación
Hortícolas	1ª Aplicación cuando tengamos 2 flores abiertas. 2ª Aplicación 20 días aproximadamente antes de la recolección. En caso de climatología adversa se podría hacer una tercera aplicación.	1 L/ha cada aplicación
Tropicales	1º Tratamiento en caída de pétalos. 2º Tratamiento cuando el fruto tenga un tercio de su tamaño final. 3º Tratamiento en el cambio de color.	1 L/ha cada aplicación
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	1ª Aplicación cuando tengamos 2 flores abiertas. 2ª Aplicación 20 días aproximadamente antes de la recolección. En caso de climatología adversa se podría hacer una tercera aplicación.	1 L/ha cada aplicación

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

En vía foliar se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general. Evitar las horas centrales del día cuando más calor hace. Cuando utilicemos varios productos en la mezcla, aplicar reguladores de pH respetando las incompatibilidades de cada producto.



La familia de **Soluciones Agronómicas Especializadas** está compuesta por formulaciones diseñadas para optimizar la eficacia de los tratamientos agrícolas y mejorar la resistencia de los cultivos. Incluye acondicionadores de pH para caldos de aplicación, así como productos con compuestos naturales y combinaciones de nutrientes que fortalecen la planta frente a diversos agentes patógenos.

Gracias a su acción preventiva y curativa, estos productos contribuyen a potenciar el vigor vegetativo, incrementando la resiliencia de los cultivos y mejorando su rendimiento productivo.



5

SOLUCIONES AGRONÓMICAS ESPECIALIZADAS

AGROCÉ CONTROL pH + 2

AGROCÉ CONTROL pH + 3

AGROCÉ GLUCUCÉ

AGROCÉ CONTROL

AGROCÉ CONTROL pH + 2 SOLUCIÓN NITROGENADA

Para conseguir la máxima eficacia del tratamiento fitosanitario y nutricional presentamos **AGROCÉ CONTROL pH + 2** que regula el pH de la mezcla al nivel óptimo que se precisa para lograr la total efectividad del tratamiento.

AGROCÉ CONTROL pH + 3 SOLUCIÓN NP 4-15

AGROCÉ CONTROL pH + 3 es una solución NP formulada para disminuir el pH de los caldos fitosanitarios. Formulación líquida, que contiene sales de fósforo sinergizadas con tensioactivos de alta calidad. Reduce la tensión superficial. Reduce la formación de espuma. Su uso evita la degradación de las materias activas (hidrólisis alcalina), manteniendo y mejorando la efectividad de los tratamientos.

CONTENIDO DECLARADO

	AGROCÉ CONTROL pH + 2	AGROCÉ CONTROL pH + 3
Nitrógeno (N) Total	4,00 % m/m	4,00 % m/m
Nitrógeno (N) Ureico	4,00 % m/m	4,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua		15,00 % m/m
	pH: 2-3 / Densidad: 1,05-1,10 g/cc	pH: 1-2 / Densidad: 1,13-1,18 g/cc

Estos productos, por su procedencia, contienen un 11 % de ácidos polihidroxicarboxílicos.

DOSIS SEGÚN TIPO DE AGUA

AGROCÉ CONTROL pH + 2			AGROCÉ CONTROL pH + 3		
pH DEL AGUA	MOMENTO DE INCORPORACIÓN	DOSIS PARA pH NEUTRO	pH DEL AGUA	MOMENTO DE INCORPORACIÓN	DOSIS PARA pH NEUTRO
7,0-7,5	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	0,75 cc/hl	10,5	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	150 cc/hl
7,5-8,0	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	0,80 cc/hl	10	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	140 cc/hl
8,0-8,5	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	0,90 cc/hl	9,5	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	130 cc/hl
8,5-9,0	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	100 cc/hl	9,0	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	110 cc/hl
9,0-9,5	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	110 cc/hl	8,5	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	100 cc/hl
9,5-10	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	125 cc/hl	8,0	Llenar medio tanque aplicar el producto y hacer la mezcla del resto de productos.	0,80 cc/hl

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Los parámetros antes indicados pueden variar en función de la cal activa y de los carbonatos de cal contenidos en el agua a tratar, por lo que aconsejamos hacer una prueba previa. Para neutralizar tanques de abonado con alta concentración de producto hacer prueba previa y revisar las dosis.



AGROCÉ GLUCUCÉ

SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE COBRE (Cu) PROCEDENTE DE SULFATO

AGROCÉ GLUCUCÉ es un corrector de carencia de cobre (Cu) con acción como bactericida que controla un amplio espectro de bacterias (Erwina, Xanthomonas, Pseudomonas, etc.) y hongos (Alternaria, Botrytis, Cercospora, Mildiu, Oidium, Phytophthora, etc.). En campo actúa como bactericida y/o fungicida.

CONTENIDO DECLARADO

Cobre (Cu) soluble en agua	6,00 % m/m
----------------------------	------------

pH: 1-3 / Densidad: 1,25-1,28 g/cc
Este producto contiene Lebbina como mejorador de los principios activos.

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 150-200 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Frutales	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Hortícolas	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Vid	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Plátanos	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Tropicales	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Viveros Ornamentales	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Olivo	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha
Cereales	Aunque tiene efecto curativo es aconsejable aplicar en función preventiva evitando los momentos de floración.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicar: 3-5 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

En riego aplicar en el tercio final del riego. En caso de problema importante utilizar el cado suficiente para mojar todas las partes de la planta. En olivo reforzar los tratamientos en primavera y otoños lluviosos.



La familia de **Nutrición Foliar Estratégica** está compuesta por soluciones líquidas y solubles, formuladas con materias primas de alta calidad y diseñadas para aportar macro y micronutrientes de manera eficiente a través de la hoja.

Cuando la absorción radicular se ve limitada por bloqueos nutricionales, estrés abiótico o condiciones adversas del suelo, la **nutrición foliar se convierte en la única vía eficaz** para corregir deficiencias y garantizar un desarrollo óptimo del cultivo. Estos productos proporcionan una respuesta rápida y precisa en cada fase fenológica, asegurando una nutrición equilibrada que maximiza el rendimiento y la calidad de la cosecha.



6

NUTRICIÓN FOLIAR ESTRATÉGICA

**AGROCÉ FOLIARES SOLUBLES
AGROCÉ FOLIARES LÍQUIDOS
AGROCÉ NITRO PLUS 42**

AGROCÉ FOLIARES SOLUBLES

ABONO SÓLIDO NPK CON MICRONUTRIENTES QUELADOS EDTA

Los fertilizantes **AGROCÉ FOLIARES SOLUBLES** son productos formulados con materias primas de alta calidad, pureza, solubilidad y perfectamente equilibrados para obtener los resultados deseados. La variedad de formulaciones nos permite acudir a la planta con la concentración más idónea para cada momento fenológico en el que se encuentre el cultivo.

CONTENIDO DECLARADO

Contenido declarado m/m	30-10-10	28-4-14	25-25-12	25-5-25	20-20-20	12-5-42	10-5-40	0-15-42	12-6-36	12-10-30
Nitrógeno (N)	30,0 %	28,0 %	25,0 %	25,0 %	20,0 %	12,0 %	10,0 %	0,0 %	12,0 %	12,0 %
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	10,0 %	4,0 %	25,0 %	5,0 %	20,0 %	5,0 %	5,0 %	15,0 %	6,0 %	10,0 %
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	10,0 %	14,0 %	12,0 %	25,0 %	20,0 %	42,0 %	40,0 %	42,0 %	36,0 %	30,0 %
Boro (B) soluble en agua	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,80 %	0,01 %	0,01 %
Cobre (Cu) EDTA soluble en agua	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Hierro (Fe) EDTA soluble en agua	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Manganeso (Mn) EDTA soluble en agua	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zinc (Zn) EDTA soluble en agua	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-500 g/hl General: 2,5-5 kg/ha
Frutales	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-500 g/hl General: 2,5-5 kg/ha
Hortícolas	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-350 g/hl General: 2,5-5 kg/ha
Vid	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-500 g/hl General: 2,5-5 kg/ha
Plátanos	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-500 g/hl General: 2,5-5 kg/ha
Tropicales	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-500 g/hl General: 2,5-5 kg/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-350 g/hl General: 2,5-5 kg/ha
Olivo	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 500-750 g/hl General: 5-7,5 kg/ha
Café	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-500 g/hl General: 2,5-5 kg/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda realizar aplicaciones utilizando el caldo suficiente para llegar a todas las partes de la planta. En aplicaciones a bajo volumen se utilizarán las dosis máximas, teniendo en cuenta las dosis totales por ha. Se puede mezclar con tratamientos fitosanitarios siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades y en caso de necesidad utilizar nuestros acondicionadores de pH.

AGROCÉ FOLIARES LÍQUIDOS

SOLUCIÓN NPK CON MICRONUTRIENTES QUELADOS EDTA

Los fertilizantes **AGROCÉ FOLIARES LIQUIDOS** son productos formulados con materias primas de alta calidad, pureza, solubilidad y perfectamente equilibrados para obtener los resultados deseados. **AGROCÉ NITRO PLUS 42** es una solución rica en nitrógeno muy asimilable. También se añaden elementos mojantes y penetrantes para conseguir una máxima eficacia.

CONTENIDO DECLARADO

Contenido declarado m/v	25-6-4	14-8-8	9-9-9	20-5-15	12-25-12	10-5-30	6-17-36	6-30-37
Nitrógeno (N)	25,0 %	14,0 %	9,0 %	20,0 %	12,0 %	10,0 %	6,0 %	6,0 %
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	6,0 %	8,0 %	9,0 %	5,0 %	25,0 %	5,0 %	17,0 %	30,0 %
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	4,0 %	8,0 %	9,0 %	15,0 %	12,0 %	30,0 %	36,0 %	37,0 %
Boro (B) soluble en agua	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %
Cobre (Cu) EDTA soluble en agua	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %
Hierro (Fe) EDTA soluble en agua	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %
Manganeso (Mn) EDTA soluble en agua	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %
Zinc (Zn) EDTA soluble en agua	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %

AGROCÉ NITRO PLUS 42

SOLUCIÓN NITROGENADA

Nitrógeno (N) Total	42,00 % m/v
Nitrógeno (N) Nitrato	10,50 % m/v
Nitrógeno (N) Amoniacal	10,50 % m/v
Nitrógeno (N) Ureico	21,00 % m/v

pH: 6-8
Densidad: 1,32 g/cc

CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 500-550 cc/hl General: 3-5 L/ha
Frutales	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-5 L/ha
Hortícolas y Vid	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Plátanos	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 300-500 cc/hl General: 2-3 L/ha
Tropicales	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Frutos del bosque, Frambuesas, etc.	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Olivo	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 500-750 cc/hl General: 5-7,5 L/ha
Café	Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo con la formulación adecuada. Consultar con su técnico especializado.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha
Cereales	Junto con los herbicidas o cualquier otro tratamiento fitosanitario.	Foliar: 150-250 cc/hl General: 1-2 L/ha

CONSEJOS PARA EL BUEN MANEJO

Se recomienda realizar aplicaciones utilizando el caldo suficiente para llegar a todas las partes de la planta. En aplicaciones a bajo volumen se utilizarán las dosis máximas, teniendo en cuenta las dosis totales por ha. Se puede mezclar con tratamientos fitosanitarios siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades y en caso de necesidad utilizar nuestros acondicionadores de pH.



La familia de **Nutrición Hidrosoluble** ofrece soluciones diseñadas para la fertirrigación, formuladas con macro y micronutrientes de alta calidad para garantizar una óptima solubilidad y máxima respuesta agronómica.

- **Línea Clásica:** Formulaciones de alta pureza y solubilidad, desarrolladas para proporcionar un suministro equilibrado de nutrientes en cada fase del cultivo, favoreciendo su desarrollo y productividad.
- **Hidrosoluble Innovative Plus:** Una línea de vanguardia que integra tecnologías avanzadas para mejorar la disponibilidad y asimilación de nutrientes, optimizando la fertirrigación incluso en condiciones adversas. Su formulación innovadora responde a las exigencias más altas del sector agrícola, asegurando una nutrición más precisa, sostenible y efectiva.



7

NUTRICIÓN HIDROSOLUBLE: PRECISIÓN Y EVOLUCIÓN

**CRISTALINOS SOLUBLES FERTIRRIGACIÓN
HIDROSOLUBLE INNOVATIVE PLUS**

CRISTALINOS SOLUBLES FERTIRRIGACIÓN

AGROCÉ 23-6-6. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	23,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	6,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

AGROCÉ 19-6-6. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	19,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	6,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

AGROCÉ 17-6-18. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	17,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	6,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	18,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

AGROCÉ 20-20-20. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	20,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	20,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	20,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

AGROCÉ 13-40-13. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	13,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	40,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	13,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

AGROCÉ 15-7-22. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	15,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	7,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	22,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

AGROCÉ 10-5-40. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	10,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	5,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	40,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

AGROCÉ 15-5-30. ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N) Total	15,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	5,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	30,00 % m/m
Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno, Zinc	

MICRONUTRIENTES SOLUBLES

Boro (B) soluble en agua	0,02 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,05 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,005 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua	0,05 % m/m



HIDROSOLUBLE INNOVATIVE PLUS

ABONO SÓLIDO NPK CON MICRONUTRIENTES

Nueva gama de **HIDROSOLUBLES INNOVATIVE PLUS** más una MOLÉCULA ORGÁNICA (polihidroxicarboxil) que produce en el cultivo una altísima actividad energética. Esta familia de productos incorpora macros y micronutrientes que junto a la molécula orgánica producen una rapidísima absorción de los nutrientes por la planta y la mejora de la nutrición por vía radicular.

AGROCÉ STARTER PLUS

Nitrógeno (N) Total	23,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	6,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,00 % m/m

Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno y Zinc
10 % POLIHIDROXICARBOXÍLICOS

AGROCÉ BLOOMING PLUS

Nitrógeno (N) Total	12,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	36,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	12,00 % m/m

Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno y Zinc
10 % POLIHIDROXICARBOXÍLICOS

AGROCÉ FATTING PLUS

Nitrógeno (N) Total	15,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	5,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	30,00 % m/m

Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno y Zinc
10 % POLIHIDROXICARBOXÍLICOS

AGROCÉ UNIVERSAL PLUS

Nitrógeno (N) Total	18,00 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y en citrato amónico neutro	18,00 % m/m
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	18,00 % m/m

Contiene: Boro, Manganeso, Molibdeno y Zinc
10 % POLIHIDROXICARBOXÍLICOS

MICRONUTRIENTES SOLUBLES

Boro (B) soluble en agua	0,02 % m/m
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,05 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,005 % m/m
Zinc (Zn) soluble en agua	0,05 % m/m



Fertinara

www.fertinara.com