



Fertinara

Cultiver l'avenir

C A T A L O G U E 2 0 2 5

TABLE DES MATIÈRES



STIMULANTS NATURELS

ALGAS PLUS	5
INCENTIVE	6
AUXICE	7
AUXICE MAX	8
FOLAMIN 15	9
FOLAMIN 30	10
FOLAMIN SIAPISA	11
ITALIN	12
FOLAMIN VEG-AMINO	13
FOLAMIN 78 WSP	14
AGROCÉ COMPLEX AMIN	15
AGROCÉ COMPLEX CUAJE	16
AGROCÉ FLOR + C	17
ORGANFER	18
AGROCÉ ENRAIZANTE	19
AGROCÉ DIRECT ROOTING	20



AMENDEMENTS DU SOL

AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS	23
HUMUSPOWER K-8	24
HUMUSPOWER ENERGY	25
HUMUSPOWER PLUS	26
AGROCÉ HÚMICO WSP	27
AGROCÉ HUMIFER	28
AGROCÉ CALCISAN	29
C-ACTIV-PUS	30



MICRONUTRITION

AGROCÉ BORO	33
AGROCÉ BORMI	34
AGROCÉ CALCIO 10	35
AGROCÉ CALCIO + AA	36
AGROCÉ CALIBOR	37
AGROCÉ Fe EDDHA	38
AGROCÉ Fe-L	39
AGROCÉ NUTRICE HIERRO	40
AGROCÉ MAGNESIO	41
AGROCÉ MAGNESIO + AA	42
AGROCÉ MANGANESO	43
AGROCÉ NUTRICE MANGANESO	44
AGROCÉ ZINC	45
AGROCÉ NUTRICE ZINC	46
AGROCÉ BOROPLUS MAGNESIO	47
AGROCÉ BOROPLUS Mg-Zn	48
AGROCÉ NUTRICE N+C+M	49

TABLE DES MATIÈRES

AGROCÉ CORRIGE + 3	50
AGROCÉ Zn+Mn MAXI	51
AGROCÉ Zn+Mn RADICULAR	52
AGROCÉ MIX Q-7	53
AGROCÉ MIXLAND	54
AGROCÉ MIXTRAL	55
AGROCÉ MIX Q-6	56



AMÉLIORATEURS DE RÉCOLTE

AGROCÉ K-33 ACID	59
AGROCÉ K-44 EXPRESS	60
AGROCÉ POTASIO K-52	61
AGROCÉ POTASIO TURBO	62
AGROCÉ NEUTRAL POTASH	63
AGROCÉ X-23	64



SPÉCIALITÉS DIVERSES

AGROCÉ CONTROL pH + 2	67
AGROCÉ CONTROL pH + 3	67
AGROCÉ GLUCUCÉ	68



ACTIVATEURS FOLIAIRES

AGROCÉ FOLIAIRES SOLUBLES	71
AGROCÉ FOLIAIRES LIQUIDOS	72
AGROCÉ NITRO PLUS 42	72



NUTRITION HYDROSOLUBLE

HYDROSOLUBLE CRYSTALLINE FERTIRRIGATION	75
HYDROSOLUBLE INNOVATIVE PLUS	76



La gamme **Stimulants Naturels** comporte des produits qui stimulent, activent et accélèrent les processus physiologiques des plantes : amélioration de l'activité de la photosynthèse, nouaison et croissance des fruits, activation du développement racinaire et de l'absorption de nutriments des cultures, obtention du plus haut niveau productif des plantes.

**1**

STIMULANTS NATURELS

**ALGAS PLUS
INCENTIVE
AUXICE
AUXICE MAX
FOLAMIN 15
FOLAMIN 30
FOLAMIN SIAPISA
ITALIN
FOLAMIN VEG-AMINO
FOLAMIN 78 WSP
AGROCÉ COMPLEX AMIN
AGROCÉ COMPLEX CUAJE
AGROCÉ FLOR + C
ORGANFER
AGROCÉ ENRAIZANTE
AGROCÉ DIRECT ROOTING**

ALGAS PLUS

EXTRAIT D'ALGUE LIQUIDE

ALGAS PLUS est un produit 100 % naturel. Il s'agit d'un stimulant naturel qui intervient dans les processus physiologiques des plantes. Sa forte activité hormonale provoquée par les cytokinines stimule de façon naturelle le métabolisme de la plante afin de renforcer sa croissance, sa floraison, sa nouaison et son grossissement. Grâce à sa teneur en potassium, il peut également être utilisé pour le grossissement et la maturation.

ALGAS PLUS active aussi la production d'hormones de croissance provoquée par les acides alginiques, polysaccharides et enzymes et augmente les défenses naturelles des plantes.

CONTENU DÉCLARÉ

Acide alginique	1,50 % m/m
Mannitol	0,50 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	4,00 % m/m
Extrait d'ASCOPHYLLUM NODOSUM	247,5-252,5 g/L
pH: 8,5-10,5 / Densité: 1,10-1,15 g/cc	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Au démarrage végétatif lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 2-3 l/ha. Racinaire: 5-8 l/ha.
Arbres fruitiers	Au démarrage végétatif lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 1,5-2,5 l/ha. Racinaire: 5-8 l/ha.
Horticulture	Au démarrage végétatif lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 1,5-2,5 l/ha. Racinaire: 5-8 l/ha.
Vigne	Au démarrage végétatif lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 1,5-2,5 l/ha. Racinaire: 5-8 l/ha.
Cultures tropicales	Au démarrage végétatif lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 2-3 l/ha. Racinaire: 5-8 l/ha.
Fruits rouges, framboises, etc.	Au démarrage végétatif lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 2-3 l/ha. Racinaire: 5-8 l/ha.
Pépinières ornementales	Au démarrage végétatif lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Racinaire: 2-5 cc/m ² .
Bananiers	Au démarrage végétatif, lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. En application racinaire, lors du remplissage des fruits.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 2-3 l/ha. Racinaire: 5-10 l/ha.
Oliviers	Au démarrage végétatif, lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement.	Foliaire: 250-350 cc/hl. Dose générale: 2-3 l/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la quantité de liquide suffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. En applications à faible volume, appliquer la dose générale. Le produit peut être utilisé seul ou accompagné de phytosanitaires, tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai préalable.

INCENTIVE

EXTRAIT D'ALGUE LIQUIDE

INCENTIVE est un concentré naturel d'algue dont l'extraction est réalisée en milieu neutre afin de préserver toutes les substances naturelles des algues suite au processus productif.

Une fois extrait, le concentré d'algue contient tous les nutriments, régulateurs de croissance et polysaccharides qui amélioreront la croissance de la plante tout en la rendant plus résistante aux infections ainsi qu'au possible stress environnemental.

CONTENU DÉCLARÉ

Acide alginique	3,00 % m/m
Mannitol	1,00 % m/m
Extrait d'ASCOPHYLLUM NODOSUM	300 g/L
pH: 4,5-5,5 / Densité: 1,13-1,16 g/cc	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Préfloraison, floraison, chute de pétales et un mois avant la récolte.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1-2 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Arbres fruitiers	Floraison, chute de pétales, formation de fruits et grossissement.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1-2 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Horticulture	15 jours après le début de la pousse, nouaison et grossissement de chaque floraison.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1-2 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	15 jours après le début de la pousse, nouaison et grossissement de chaque floraison.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1-2 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Vigne	10-15 cm de pousse, floraison, véraison et après la vendange.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Bananiers	Coupe inférieure du tronc, floraison, remplissage des fruits, second remplissage des fruits.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1-2 L/ha Radiculaire: 3-7 L/ha
Cultures tropicales	Voie foliaire en floraison et nouaison. Voie radiculaire en grossissement.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1-2 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Pépinières ornementales	Au démarrage végétatif, lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement. Voie radiculaire lors de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 150-200 cc/hl Radiculaire: 2-3 cc/m ²
Oliviers	Au démarrage végétatif, lors d'une plus grande montée de sève et pendant les moments de stress. En phases initiale et finale du grossissement.	Foliaire: 150-200 cc/hl Dose générale: 1-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la quantité de liquide suffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. En applications à faible volume, appliquer la dose générale. Le produit peut être utilisé seul ou accompagné de phytosanitaires, tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai préalable.

AUXICE

SOLUTION NK 4-5 AVEC EXTRAIT D'ALGUES ET ACIDES AMINÉS

AUXICE est un stimulant qui favorise la floraison, nouaison et grossissement des fruits. C'est un produit formulé avec des acides aminés très actifs, gibbérellines et auxines d'origine naturelle et cytokinines des algues de mers froides et fortes marées, *Ascophyllum Nodosum*. La parfaite proportion de ses matières actives intensifie toute l'activité hormonale de la plante stimulant les processus décrits.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,15, Acide glutamique : 0,16, Sérine : 0,22, Histidine : 0,06, Glycine : 0,26, Thréonine : 0,10, Arginine : 0,14, Alanine : 0,35, Valine : 0,06, Isoleucine : 0,044, Phénylalanine : 0,054, Leucine : 0,13, Lysine : 0,044, Proline : 0,19, Cystéine : 0,038.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	2,00 % m/m
Azote (N) total	4,00 % m/m
Azote (N) organique	2,10 % m/m
Azote (N) nitrique	0,73 % m/m
Azote (N) uréique	1,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	5,10 % m/m
Mannitol	0,28 % m/m

pH: 6-8 / Densité: 1,10-1,15 g/cc

Ce produit contient, par sa provenance, 20 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-8 L/ha
Arbres fruitiers	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 5-8 L/ha
Horticulture	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 5-8 L/ha
Vigne	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 5-8 L/ha
Bananiers	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-10 L/ha
Cultures tropicales	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-8 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-8 L/ha
Pépinières ornementales	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Radiculaire: 2-5 cc/m ²
Oliviers	Depréfloraison à chute des pétales pour obtenir la nouaison maximale. D'un tiers de la taille du fruit jusqu'à la récolte pour obtenir plus de production. En application radiculaire au moment de la formation de nouvelles racines.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 2-3 L/ha

AUXICE MAX

ENGRAIS ORGANIQUE MINÉRAL PK LIQUIDE

AUXICE MAX est un produit en provenance d'extraits végétaux de différentes plantes et dont l'extraction se réalise à l'aide de procédés enzymatiques totalement contrôlés. Grâce à son processus d'élaboration on obtient des plantes un mélange équilibré d'auxines, gibbérellines et autres principes actifs qui sont spécialement liés au développement équilibré des cultures.

La principale fonction du produit **AUXICE MAX** est l'importante systémie à travers les feuilles, racines et bois intensifiant le mouvement de la sève aidant ainsi à la réalisation des processus physiologiques végétaux fondamentaux comme la photosynthèse, la respiration et la nutrition.

Puisque l'on provoque une plus grande basculation de la sève les périodes de temps nécessaires pour que la plante achève ses différentes phases de culture sont raccourcies. Ceci entraîne une augmentation et une anticipation de la cueillette pour de nombreuses cultures.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	1,50 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	4,10 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans du citrate d'ammonium neutre et dans l'eau	4,10 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	0,70 % m/m
Carbone (C) organique	4,35 % m/m

pH: 7 / Densité: 1,09 g/cc

Ce produit, par sa provenance, contient 7 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes et Arbres fruitiers	Manque de floraison, à la chute des pétales et grossissement.	Foliaire : 100-150 cc/hl jusqu'à 30 % de chute des pétales Foliaire : 75 cc-100 cc/hl 15 jours après la première
Horticulture	Manque de floraison, à la chute des pétales et grossissement.	Foliaire : 100-200 cc/hl plusieurs applications
Vigne	Boutons floraux séparés et début de floraison.	Foliaire : 1-2 L/ha
Bananiers	Remplissement de fruits.	Foliaire : 100-200 cc/hl
Cultures tro-picales	Début de floraison et quand les fleurs terminent de tomber.	Foliaire : 100-200 cc/hl
Fruits rouges, framboises, etc.	Manque de floraison, chute des pétales et grossissement.	Foliaire : 100-200 cc/hl plusieurs applications
Oliviers	Au démarrage végétatif, chute des pétales et grossissement.	Foliaire : 50-100 cc/hl

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

En application foliaire, il est recommandé d'utiliser la dose suffisante pour appliquer la dose générale, en utilisation à faible volume d'eau, utiliser la dose maximale. Lors de l'utilisation de produits contenant du calcium, réaliser des tests de compatibilité au préalable. Pour les cultures horticolas, il sera utilisé sur toutes les grappes ou floraisons où l'on souhaitera agir. Eviter les heures centrales de la journée quand il fait plus chaud. Lorsque plusieurs produits sont utilisés dans le mélange, utiliser des régulateurs de pH.

Inscrit au MAPAMA, n° F0002639/2026

FOLAMIN 15

ACIDES AMINÉS

FOLAMIN 15 est un stimulant qui produit un effet antistress provoqué par les adversités météorologiques, parasites, pollutions toxiques et interventions anthropiques négatives. Il améliore les processus biologiques induisant une augmentation de la végétation et de la production, augmentant l'activité et les dimensions du système racinaire. Ce sont donc les acides aminés libres qui sont responsables d'un perfectionnement significatif dans le métabolisme de la plante puisqu'ils sont absorbés rapidement ce qui favorise son développement ultérieur.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 1,45, Acide glutamique : 3,67, Sérine : 0,81, Histidine : 0,80, Glycine : 0,88, Thréonine : 0,23, Arginine : 1,08, Alanine : 1,08, Tyrosine : 0,24, Valine : 0,79, Méthionine : 0,20, Isoleucine : 0,16, Phénylalanine : 0,85, Leucine : 0,67, Lysine : 1,08, Hydroxyproline : 0,26, Proline : 0,75.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	15,00 % m/m
Azote (N) total	4,50 % m/m
Azote (N) organique	3,00 % m/m
Azote (N) uréique	1,50 % m/m

pH: 5-6 / Densité: 1.18-1.22 g/cc

Ce produit, par sa provenance, contient un 45 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec des insecticides pour la mineuse. En irrigation deux applications au printemps et grossissement.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. Pour les pruniers faire un essai au préalable, de nombreuses variétés ne sont pas compatibles avec les acides aminés	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement aux moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Vigne	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 200-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 5-10 L/ha
Bananiers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. En irrigation deux applications au printemps et grossissement.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. En irrigation deux applications au printemps et grossissement.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement aux moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Pépinières ornementales	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement aux moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire : 250-300 cc/hl Radiculaire : 3-4 cc/m2
Oliviers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement d'automne et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 2-2,5 L/ha
Céréales	Avec les traitements d'herbicides ou phytosanitaires.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

FOLAMIN 15 peut s'utiliser associé aux traitements phytosanitaires, mais il est fortement conseillé de le mélanger à un engrais foliaire AGROCE pour que la stimulation du produit soit totalement satisfaisante pour la culture.

FOLAMIN 30

ACIDES AMINÉS

FOLAMIN 30 est un stimulant à forte teneur en acides aminés en provenance de l'hydrolyse de protéines (hydrolyse acide de la kératine naturelle). En plus de stimulant foliaire, il provoque, quand il est utilisé par voie racinaire, une stimulation de production de nouvelles racines et une amélioration de l'activité microbienne au sol.

L'assimilation rapide du produit par la plante unie à son action stimulante produit une grande réaction végétative sur toute sorte de culture

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 2,67, Acide glutamique : 6,62, Sérine : 1,45, Histidine : 1,43, Glycine : 1,57, Thréonine : 0,41, Arginine : 1,94, Alanine : 1,94, Tyrosine : 0,44, Valine : 1,41, Méthionine : 0,36, Isoleucine : 0,29, Phénylalanine : 1,51, Leucine : 1,20, Lysine : 1,94, Hydroxyproline : 0,47, Proline : 1,35.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	27,00 % m/m
Azote (N) total	8,02 % m/m
Azote (N) organique	5,41 % m/m
Azote (N) uréique	2,61 % m/m

pH: 5-6 / Densité: 1,18-1,22 g/cc

Ce produit contient, par sa provenance, 40 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec des insecticides pour la mineuse. En irrigation deux applications au printemps et grossissement.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. Ne pas appliquer sur les pruniers.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement pendant les moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Vigne	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 5-10 L/ha
Bananiers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. En irrigation deux applications au printemps et grossissement.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. En irrigation deux applications au printemps et grossissement.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement pendant les moments de stress de la plante. En arrosage à chaque pousse.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 10-20 L/ha
Pépinières ornementales	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement pendant les moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire : 100-200 cc/h Radiculaire : 3-4 cc/m ²
Oliviers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement d'automne et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 2-2,5 L/ha
Céréales	Avec les traitements d'herbicides ou phytosanitaires.	Foliaire : 100-300 cc/hl Générale : 1-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

FOLAMIN 30 peut s'utiliser associé aux traitements phytosanitaires, mais il est fortement conseillé de le mélanger à un engrais foliaire AGROCE pour que la stimulation du produit soit totalement satisfaisante pour la culture.

FOLAMIN SIAPISA

ACIDES AMINÉS

FOLAMIN SIAPISA contient des acides aminés qui proviennent d'un processus d'hydrolyse contrôlée de protéines d'origine animale. Son action stimulante produit une réaction végétative intense sur toute sorte de culture. Utilisé aux moments de besoin maximal de la plante, il offre à celle-ci les éléments stimulants nécessaires pour compléter de manière satisfaisante les cycles naturels de croissance, nouaison et grossissement.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,70, Acide glutamique : 1,23, Alanine : 0,38, Arginine : 0,50, Cystéine : 0,26, Phénylalanine : 0,36, Glycine : 1,65, Isoleucine : 0,30, Histidine : 0,24, Leucine : 0,63, Lysine : 0,31, Proline : 1,07, Sérine : 0,96, Tyrosine : 0,10, Thréonine : 0,90, Valine : 0,41.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	10,00 % m/m
Azote (N) total	9,24 % m/m
Azote (N) organique	8,65 % m/m

pH: 6-7 / Densité: 1,23-1,25 g/cc

Ce produit, par sa provenance, contient 57% de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec des insecticides pour la mineuse.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 12-20 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. Ne pas appliquer sur les pruniers sans faire un essai au préalable.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 12-20 L/ha
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement aux moments de stress de la plante.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 12-20 L/ha
Vigne	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 200-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 5-20 L/ha
Bananiers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 12-20 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer au début de la pousse, au grossissement et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 12-20 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement aux moments de stress de la plante.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha Radiculaire : 12-20 L/ha
Pépinières ornementales	Appliquer pendant tout le cycle de culture, spécialement aux moments de stress de la plante.	Foliaire : 200-250 cc/hl Radiculaire : 2-5 cc/m2
Oliviers	Appliquer au début de la pousse, au grossissement d'automne et aux moments de stress de la plante. En plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 1,5-2,5 L/ha
Céréales	Avec les traitements d'herbicides ou phytosanitaires.	Foliaire : 200-350 cc/hl Générale : 1-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

FOLAMIN SIAPISA peut s'utiliser associé aux traitements phytosanitaires mais il est fortement conseillé de le mélanger à un engrais foliaire AGROCE pour que la stimulation du produit soit totalement satisfaisante pour la culture.

ITALIN

ACIDES AMINÉS

ITALIN est un acide aminé de grande qualité obtenu par hydrolyse acide sur des tissus d'origine animale choisis pour leur forte teneur en collagène. En raison de sa concentration d'acides aminés lévogyres, c'est un produit à appliquer en toute situation de stress que souffrent les cultures.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique: 0,46. Acide glutamique: 0,51. Alanine: 1,12. Arginine: 0,42. Cystéine: 0,12. Phénylalanine: 0,17. Glycine: 0,81. Isoleucine: 0,14. Histidine: 0,18. Leucine: 0,41. Lysine: 0,14. Proline: 0,61. Sérine: 0,70. Thréonine: 0,32. Valine: 0,19.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	6,30 % m/m
Azote (N) total	6,80 % m/m
Azote (N) organique	6,50 % m/m

pH: 6-7 / Densité: 1,20-1,25 g/cc

Ce produit contient, par sa provenance, 47 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec des insecticides contre la mineuse. Voie radiculaire, deux applications au printemps et en développement.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. Pour les pruniers, réaliser un essai préalable, de nombreuses variétés de cet arbre n'étant pas compatibles avec les acides aminés.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle de la culture, notamment pendant les moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Appliquer pendant tout le cycle de la culture, notamment pendant les moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 5-10 L/ha
Pépinières ornementales	Appliquer pendant tout le cycle de la culture, notamment pendant les moments de stress de la plante. En irrigation à chaque pousse.	Foliaire: 250-300 cc/hl Radiculaire: 3-4 cc/m²
Vigne	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 5-10 L/ha
Bananiers	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. Voie radiculaire, deux applications au printemps et en développement.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. Voie radiculaire, deux applications au printemps et en développement.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Oliviers	Appliquer en début de pousse, développement d'automne et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire: 250-500 cc/hl Générale: 2-2,5 L/ha
Céréales	Avec les traitements herbicides ou phytosanitaires.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 1,5-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

ITALIN peut être appliqué avec les traitements phytosanitaires, mais il est fortement recommandé de le mélanger avec un engrais foliaire AGROCE pour que la stimulation du produit soit plus efficace pour la culture.

FOLAMIN VEG-AMINO

ACIDES AMINÉS

FOLAMIN VEG-AMINO est un produit formulé à base d'acides aminés libres provenant de l'hydrolyse de protéines d'origine VÉGÉTALE. Il active la physiologie végétale et les processus hormonaux des cultures. Il stimule la fonction chlorophyllienne de la plante, favorise le développement végétatif des cultures et permet une grande économie d'énergie.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique: 0,60. Acide glutamique: 7,09. Alanine: 1,33. Phénylalanine: < 0,01. Glycine: 0,10. Histidine: 0,04. Isoleucine: 0,02. Leucine: 0,04. Lysine: 0,08. Méthionine: < 0,01. Proline: 0,01. Sérine: 0,02. Tyrosine: 0,29. Thréonine: 0,17. Tryptophane: < 0,01. Valine: 0,21.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	10,00 % m/m
Ammoniacal Nitrogen (N)	6,50 % m/m
Azote (N) organique	3,00 % m/m
Azote (N) total	3,50 % m/m

pH: 6,4-6,6 / Densité: 1,20-1,25 g/cc

Ce produit contient par sa provenance 40 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agurmes	Appliquer en début de pousse, au grossissement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec des insecticides contre la mineuse.	Foliaire: 150-250 cc/hl Radiculaire: 5-20 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer en début de pousse, grossissement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés. Ne pas appliquer sur les pruniers sans faire d'essai préalable.	Foliaire: 150-250 cc/hl Radiculaire: 5-20 L/ha
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle de la culture, notamment pendant les moments de stress de la plante.	Foliaire: 150-250 cc/hl Radiculaire: 5-25 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Appliquer pendant tout le cycle de la culture, notamment pendant les moments de stress de la plante.	Foliaire: 150-250 cc/hl. Générale: 1,5-2,5 l/ha en plusieurs applications. Radiculaire: 5-25 L/ha.
Pépinières ornementales	Appliquer pendant tout le cycle de la culture, notamment pendant les moments de stress de la plante.	Foliaire: 150-250 cc/hl. Générale: 1,5-2,5 l/ha en plusieurs applications. Radiculaire: 2-5 cc/m².
Vigne	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire: 150-250 cc/hl Radiculaire: 5-20 L/ha
Bananiers	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire: 150-250 cc/hl Radiculaire: 5-20 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer en début de pousse, développement et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire: 150-250 cc/hl Radiculaire: 5-20 L/ha
Oliviers	Appliquer en début de pousse, grossissement d'automne et pendant les moments de stress de la plante. Sur les plants avec les traitements phytosanitaires autorisés.	Foliaire: 150-250 cc/hl Générale: 1,5-2,5 L/ha
Céréales	Avec les traitements herbicides ou phytosanitaires.	Foliaire: 150-250 cc/hl Générale: 1-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Le produit peut être employé seul ou avec des traitements contre les invasions ou les maladies, en application foliaire après vérification de la compatibilité du mélange, et en complément de la fertirrigation, en application radiculaire.

FOLAMIN 78 WSP

ACIDES AMINÉS

FOLAMIN 78 WSP est un stimulant à forte teneur en acides aminés issus de l'hydrolyse de protéines (hydrolyse acide de la kératine naturelle) qui présente l'une des plus fortes concentrations d'acides aminés L à assimilation rapide du marché. Il contient 78-80 % d'acides aminés L, entièrement disponibles et assimilables par la plante et se caractérise également par sa forte teneur en sérine et proline, des agents antistress face aux processus thermiques ou hydriques. C'est une formule en poudre soluble qui garantit une facilité maximale de dosage et de solubilité

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique: 5,70. Alanine: 3,76. Cystéine: 1,95. Glycine: 6,19. Isoleucine: 3,83. Lysine: 1,46. Proline: 8,54. Tyrosine: 0,85. Valine: 6,48. Acide glutamique: 8,58. Arginine: 5,58. Phénylalanine: 4,03. Histidine: 0,58. Leucine: 6,30. Méthionine: 0,37. Sérine: 10,0. Thréonine: 3,80.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	78,00 % m/m
Azote (N) total	11,40 % m/m
Azote (N) organique	11,40 % m/m
pH: 5 (10 % de dissolution)	
Ce produit contient par sa provenance 90 % de matière organique	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Arbres fruitiers	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Horticulture	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Vigne	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Bananiers	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Cultures tropicales	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Fruits rouges, framboises, etc.	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Pépinières ornementales	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement. En irrigation pour augmenter la masse racinaire.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Oliviers et oléagineux en général	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Café	Pendant tout le cycle végétatif, pendant les moments d'effort maximum de la plante, pour mobiliser la sève, et en phase de développement.	Foliaire: 0,50-100 g/hl. Radiculaire: 1,5-5 kg/ha en plusieurs irrigations.
Céréales, luzerne et riz	Deux applications en phase de croissance et de formation de fruit.	Foliaire: 0,5 kg/ha.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

En raison de ses conditions physiques, une dissolution préalable est conseillée. Il est recommandé de conserver le produit dans son récipient d'origine, bien fermé et à l'abri du soleil. En raison de ses conditions physico-chimiques, le produit peut être utilisé en application foliaire ainsi que pour tout type de système d'irrigation et en injection directe.

AGROCÉ COMPLEX AMIN

SOLUTION NPK 10-6-6 AVEC MICRONUTRIMENTS ET ACIDES AMINÉS

AGROCE COMPLEX AMIN est une formule équilibrée et universelle pour tout type de culture dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison. La combinaison de NPK avec l'acide aminé incorporé favorise la très rapide traslocation de nutriments dans toute la culture de façon immédiate.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,19, Acide glutamique : 0,50, Sérine : 0,11, Histidine : 0,10, Glycine : 0,12, Thréonine : 0,03, Arginine : 0,14, Alanine : 0,14, Tyrosine : 0,04, Valine : 0,10, Méthionine : 0,03, Isoleucine : 0,02, Phénylalanine : 0,11, Leucine : 0,09, lysine : 0,14, Hydroxyproline : 0,03, Proline : 0,11

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	2,00 % m/m
Azote (N) total	10,00 % m/m
Azote (N) organique	0,60 % m/m
Azote (N) amoniacal	1,82 % m/m
Azote (N) nitrique	0,96 % m/m
Azote (N) uréique	6,62 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 % m/m
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,002 % m/m
Fer (Fe) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,02 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,002 % m/m

pH: 6,5-7,5 / Densité: 1,20-1,25 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison et pour les moments de stress.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison et pour les moments de stress.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Horticulture	A partir de plante avec trois feuilles nouvelles, dans toutes les pousses et pour des moments de stress.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 2-3 L/ha
Vigne	Appliquer dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison et pour des moments de stress.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Bananiers	Appliquer dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison et pour des moments de stress.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Cultures tro-picales	Appliquer dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison et pour des moments de stress.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc	A partir de plante avec trois feuilles nouvelles, dans toutes les pousses et pour des moments de stress.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 2-3 L/ha
Oliviers	Appliquer dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison et pour des moments de stress.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Café	Appliquer dès le démarrage végétatif jusqu'à la préfloraison et pour des moments de stress.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Céréales	Avec les herbicides ou tout autre traitement phytosanitaire.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 1-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose suffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. En applications à faible volume appliquer la dose générale. Peut être appliqué seul ou associé à des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable.

AGROCÉ COMPLEX CUAJE

SOLUTION NPK 4-11-8 AVEC MICRONUTRIMENTS ET ACIDES AMINÉS

AGROCE COMPLEX CUAJE est une formule équilibrée et universelle pour tout type de culture dès la préfloraison jusqu'au grossissement et maturation. La combinaison de NPK pour ces moments, unis à l'acide aminé et le bore, favorisent la nouaison des cultures et leur ultérieur grossissement. De plus l'adéquante proportion d'acide aminé favorise la très rapide traslocation des nutriments de façon immédiate.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,19, Acide glutamique : 0,50, Sérine : 0,11, Histidine : 0,10, Glycine : 0,12, Thréonine : 0,03, Arginine : 0,14, Alanine : 0,14, Tyrosine : 0,04, Valine : 0,10, Méthionine : 0,03, Isoleucine : 0,02, Phénylalanine : 0,11, Leucine : 0,09, Lysine : 0,14, Hydroxyproline : 0,03, Proline : 0,11

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	2,00 % m/m
Azote (N) total	4,00 % m/m
Azote (N) organique	0,40 % m/m
Azote (N) uréique	3,20 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	11,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	8,00 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	0,60 % m/m
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,002 % m/m
Fer (Fe) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,02 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,002 % m/m

pH: 6-7 / Densité: 1,20-1,25 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Horticulture	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 2-3 L/ha
Vigne	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Bananiers	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 250-350 cc/hl Générale : 2-3 L/ha
Oliviers	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Café	Appliquer dès préfloraison jusqu'à grossissement et maturation.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 3-5 L/ha
Céréales	Avec les herbicides ou tout autre traitement phytosanitaire.	Foliaire : 350-500 cc/hl Générale : 1-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose isuffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. En application à faible volume appliquer la dose générale. Peut être appliqué seul ou associé avec des phytosanitaires, tenant toujours compte des incompatibilités de mélange ou faire un essai au préalable.

AGROCÉ FLOR + C

ENGRAIS NP 3-15 AVEC BORE (B) ET MOLYBDÈNE (Mo)

AGROCE FLOR + C est spécialement formulé pour obtenir une floraison et une bonne nouaison des fruits. Sa formulation combine une forte teneur de bore et molybdène avec du phosphore, recherchant la synergie de tous les composants pour assurer une meilleure floraison, une bonne nouaison et l'adéquat développement des fruits obtenus. Son application permettra, sous des conditions de culture adéquates, d'obtenir une meilleure floraison et nouaison, une récolte plus importante, une plus grande précocité et des fruits de meilleure qualité.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	3,00 % m/m
Ammoniacal Nitrogen (N)	3,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	15,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans du citrate d'ammonium neutre et dans l'eau	15,00 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	8,00 % m/m
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	7,50 % m/m

pH: 6,7 (dissolution 10 %)

Ce produit, para sa provenance, contient 5 % d'Ascophyllum Nodosum.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Melon	Ne s'appliquera qu'en cas d'observer peu de fleurs pour son utilisation comme pour la pastèque.	Radiculaire : 2-3 kg/ha 1-2 applications
Pastèque	Au début de la floraison et de l'introduction de pollinisateurs, réaliser 2 applications.	Radiculaire : 1 kg/ha 3-4 applications
Tomate et aubergine	Appliquer aux premiers bouquets floraux.	Radiculaire : 2 kg/ha 3-4 applications
Courgette	Avec les premières fleurs et régulièrement suivant la progression de la floraison et nouaison des fruits.	Radiculaire : 3 kg/ha 3-4 applications
Concombre	Avec les premières fleurs et régulièrement suivant la progression de la floraison et nouaison des fruits.	Radiculaire : 4 kg/ha 3-4 applications
Piment	Appliquer à la chute des pétales pour les premières fleurs.	Radiculaire : 2-3 kg/ha 2 applications

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Le produit est fabriqué pour son utilisation radiculaire mais il peut être appliqué par voie foliaire sous conseil technique. Les applications successives ne se réaliseront pas avant 15 jours. En cas d'adversité climatologique, les applications peuvent être augmentées. Maintenir le produit dans son contenant d'origine.

ORGANFER

FERTILISANT ORGANIQUE NK LIQUIDE D'ORIGINE VÉGÉTALE

ORGANFER est un nutriment organique liquide d'origine végétale. Son utilisation en tant que nutriment organique est acceptée en agriculture écologique. Grâce à sa composition il est indiqué lors des principales phases du cycle végétatif (croissance, nouaison et grossissement) et pendant les périodes de stress maximum de la plante. Les composants d'**ORGANFER** sont rapidement assimilés par la plante, ce qui améliore la structure des sols.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	3,20 % m/m
Azote (N) organique	2,80 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) total	3,10 % m/m
Carbone (C) organique	22,40 % m/m
C/N	8,00 m/m

pH: 5,5 / Densité: 1,20 g/cc

Ce produit contient par sa provenance 38 % de matière organique et 33 % d'extrait humique total

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Application possible en tant que source de nutrition organique sur tout type de culture en renforçant la dose lors de la pousse et du grossissement.	Radiculaire: 60-120 l/ha en plusieurs irrigations.
Arbres fruitiers	Application possible en tant que source de nutrition organique sur tout type de culture en renforçant la dose lors de la pousse et du grossissement.	Radiculaire: 60-120 l/ha en plusieurs irrigations.
Bananiers	Application possible en tant que source de nutrition organique sur tout type de culture en renforçant la dose lors de la pousse et du grossissement.	Radiculaire: 80-200 l/ha en plusieurs irrigations.
Cultures tropicales	Application possible en tant que source de nutrition organique sur tout type de culture en renforçant la dose lors de la pousse et du grossissement.	Radiculaire: 60-120 l/ha en plusieurs irrigations.
Oliviers	Application possible en tant que source de nutrition organique sur tout type de culture en renforçant la dose lors de la pousse et du grossissement.	Radiculaire: 60-80 l/ha en plusieurs irrigations.
Horticulture	Application possible en tant que source de nutrition organique sur tout type de culture en renforçant la dose lors de la croissance et en répartissant le reste de la dose totale pendant tout le cycle de culture.	Radiculaire: 60-140 l/ha en plusieurs irrigations.
Fruits rouges, framboises, etc.	Application possible en tant que source de nutrition organique sur tout type de culture en renforçant la dose lors de la croissance et en répartissant le reste de la dose totale pendant tout le cycle de culture.	Radiculaire: 60-120 l/ha en plusieurs irrigations.
Vigne	Appliquer en début de pousse jusqu'à la véraison et pendant les moments de stress.	Radiculaire: 40-80 l/ha en plusieurs irrigations.
Pépinières ornementales	Pendant la période en pépinière en répartissant par doses hebdomadaires.	Radiculaire: 5-10 cc/m ² par semaine.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

À appliquer en irrigation localisée, par inondation ou par injection mécanique dans la zone racinaire.

Il est recommandé de mélanger le produit avec des correcteurs à appliquer en cas de besoin ou de maintien de la culture. Peut être mélangé dans la cuve d'engrais en tenant compte des incompatibilités de mélange.

Inscrit au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Alimentation et de l'Environnement d'Espagne sous le numéro F0002545/2025.

AGROCÉ ENRAIZANTE

SOLUTION NPK 5,8-1,5-1,2 AVEC NUTRIMENTS CHÉLATÉS EDTA ET ACIDES AMINÉS

AGROCE ENRAIZANTE est un engrais spécial qui contient des acides aminés, macronutriments et micronutriments chélatés pour être appliqué à tout moment de la transplantation, pour développer la masse racinaire de toute culture à toute période et pour donner une nutrition complète voie sol.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,54, Acide glutamique : 1,35, Sérine : 0,29, Histidine : 0,29, Glycine : 0,32, Thréonine : 0,08, Arginine : 0,39, Alanine : 0,40, Tyrosine : 0,10, Valine : 0,29, Méthionine : 0,07, Isoleucine : 0,06, Phénylalanine : 0,31, Leucine : 0,25, Lysine 0,40, Hydroxyproline : 0,09, Proline : 0,27

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	5,50 % m/m
Azote (N) total	5,81 % m/m
Azote (N) organique	1,10 % m/m
Azote (N) uréique	4,44 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l'eau	1,50 % m/m
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	1,20 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	0,025 % m/m
Cuivre (Cu) EDTA soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,025 % m/m
Fer (Fe) EDTA soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,035 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,025 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,025 % m/m

pH: 5-6 / Densité: 1,18-1,23 g/cc

Ce produit, par sa provenance, contient 20 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Dans la transplantation, à la sortie de l'hiver, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications
Arbres fruitiers	Dans la transplantation, à la sortie de l'hiver, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications
Horticulture	Dans la transplantation, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications
Vigne	Dans la transplantation, à la sortie de l'hiver, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications
Bananiers	Dans la transplantation, à la sortie de l'hiver, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications
Cultures tropicales	Dans la transplantation, à la sortie de l'hiver, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications
Fruits rouges, framboises, etc	Dans la transplantation, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications
Pépinières ornementales	Dans la transplantation, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 3-6 cc/m ² 2-4 applications
Oliviers	Dans la transplantation, à la sortie de l'hiver, dans les phases de plus grande croissance ou lorsque son état végétatif décline pour toute raison de stress ou phytotoxicité.	Radiculaire : 5-10 L/ha 2-4 applications

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit pour application racinaire. Pour une application correcte il est conseillé d'agiter la cuve d'abonnement. Pour l'Irrigation par superficie, il est conseillé d'augmenter les doses de 25 %.

AGROCÉ DIRECT ROOTING

SOLUTION PK 12,2-2,6 AVEC ACIDES AMINÉS

AGROCE DIRECT ROOTING se compose de différentes matières actives, toutes d'origine naturelle à l'exception du phosphore. Dans sa composition se trouvent des acides aminés, cytokinines, bêtaïnes, auxines naturelles, macro-nutriments et un important pourcentage de matière organique, ces composants font que les racines soient plus longèves et résistantes à certaines attaques de pathogènes en plus de promouvoir continuellement la stimulation des racines nouvelles.

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,40, Acide glutamique : 0,99, Sérine : 0,21, Histidine : 0,21, Glycine : 0,23, Thréonine : 0,06, Arginine : 0,29, Alanine : 0,29, Tyrosine : 0,06, Valine : 0,21, Méthionine : 0,05, Isoleucine : 0,04, Phénylalanine : 0,22, Leucine : 0,18, Lysine : 0,29, Hydroxyproline : 0,07, Proline : 0,20

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	4,00 % m/m
Azote (N) total	1,73 % m/m
Azote (N) organique	1,25 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	12,25 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	2,64 % m/m

pH: 2-3 / Densité: 1,25-1,30 g/cc

Ce produit, par sa provenance, contient 30 % de matière organique.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	5-15 cc par pied pour transplantation 25-50 cc par pied pour adultes 2-3 applications selon besoin
Arbres fruitiers	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	5-15 cc par pied pour transplantation 25-50 cc par pied pour adultes 2-3 applications selon besoin
Horticulture	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	Radiculaire : 3-5 L/ha 2-4 applications Dose totale : 6-12 L/ha
Vigne	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	5-15 cc par pied pour transplantation 25-50 cc par pied pour adultes 2-3 applications selon besoin
Bananiers	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	5 cc par pied pour transplantation 5 cc par pied pour adultes 2-3 applications selon besoin
Cultures tropicales	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	Radiculaire : 2-3 L/ha 3-4 applications Dose totale : 6-12 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	Radiculaire : 3-6 L/ha 2-4 applications Dose totale : 6-12 L/ha
Pépinières ornementales	A l'enracinement des plants et pour former une masse radiculaire.	Radiculaire : 3-5 cc/m ² plusieurs applications
Oliviers	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	Radiculaire : 2-3 L/ha 3-4 applications Dose totale : 6-12 L/ha
Café	En transplantation à partir de la première irrigation, pour récupérer les plantations qui ont besoin de soutien, et pour perte de racines affectées de champignons ou parasites.	5-15 cc par pied pour transplantation 25-50 cc par pied pour adultes 2-3 applications selon besoin

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit pour application radiculaire. Pour une correcte application du produit il est conseillé d'agiter la cuve d'abonnement. En irrigation par superficie il est conseillé d'augmenter la dose 25 %.



La terre est l'une des ressources les plus importantes dans les systèmes de production agricole. La salinisation, la fatigue, la dégradation chimique, physique ou biologique ont pour conséquence la perte de fertilité des sols et donc des limitations de production potentielle des cultures.

Les traitements avec des produits qui améliorent toutes ces conditions du sol se font indispensables pour atteindre les objectifs de qualité et quantité exigés par l'agriculture d'aujourd'hui.



2

AMENDEMENTS DU SOL

AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS

HUMUSPOWER K-8

HUMUSPOWER ENERGY

HUMUSPOWER PLUS

AGROCÉ HÚMICO WSP

AGROCÉ HUMIFER

AGROCÉ CALCISAN

C-ACTIV-PLUS

AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS

H-20

H-20-PLUS

H-25

ACIDES HUMIQUES

AGROCE HÚMICOS LÍQUIDOS forme, avec les argiles, le complexe argilo-humique, qui retient les particules d'eau et les nutriments pendant beaucoup plus longtemps. Il libère les macronutriments et micronutriments bloqués par les excès de carbonate de calcium présents dans nos sols. Il compose, avec les nutriments, un radical cationique qui favorise l'introduction de la particule alimentaire dans la plante. Il permet un développement racinaire plus important et plus rapide et améliore la vie bactérienne du sol. Il renforce les chélats et évite la rétrogradation des potasses et phosphates.

CONTENU DÉCLARÉ

	AGROCÉ H-20	AGROCÉ H-20-PLUS	AGROCÉ H-25
Extrait humique total	20,00 % m/m	20,00 % m/m	25,00 % m/m
Acides humiques	10,00 % m/m	14,00 % m/m	10,00 % m/m
Acide fulviques	10,00 % m/m	6,00 % m/m	15,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	7,00-9,00 % m/m	7,00-9,00 % m/m	7,00-9,00 % m/m

pH: 12-14 / Densité: 1.14-1.20 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Au début de la végétation, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	Radiculaire: 20-40 l/ha.
Arbres fruitiers	Au début de la végétation, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	Radiculaire: 20-40 l/ha.
Cultures tropicales	Au début de la végétation, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	Radiculaire: 20-40 l/ha.
Café	Au début de la végétation, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	Radiculaire: 20-40 l/ha.
Horticulture	Lors des premières irrigations, pour développer le bulbe racinaire et renforcer la végétation, pendant le cycle de culture, en renforçant aux moments de stress.	Radiculaire: 20-50 l/ha. Serre jusqu'à 60 l/ha.
Fruits rouges, framboises, etc.	Lors des premières irrigations, pour développer le bulbe racinaire et renforcer la végétation, pendant le cycle de culture, en renforçant aux moments de stress.	Radiculaire: 20-50 l/ha. Serre jusqu'à 60 l/ha.
Plantes ornementales	Lors des premières irrigations, pour développer le bulbe racinaire et renforcer la végétation, pendant le cycle de culture, en renforçant aux moments de stress.	Radiculaire: 2-3 cc/m ² par application.
Vigne	Au début de la végétation et du grossissement.	Radiculaire: 20-40 l/ha.
Oliviers	Au début de la végétation et du grossissement.	Radiculaire: 20-40 l/ha.
Bananiers	Répartir la dose pendant tout le cycle végétatif et en période de croissance maximale.	Radiculaire: 20-50 l/ha. Serre jusqu'à 80 l/ha.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit à application racinaire par irrigation ou injection directe. Agiter les contenants avant d'appliquer à la cuve d'engrais. Ne pas mélanger avec des produits à pH acide, ni avec du nitrate de calcium ni avec des huiles dérivées du pétrole.

REACH: 01-2119484861-29-0023



HUMUSPOWER K-8

ACIDES HUMIQUES

HUMUSPOWER K-8 est un produit d'origine végétale issu de la léonardite, des lignites oxydés pendant des millions d'années et des sels de potassium totalement solubles. Avec les doses indiquées, le sol reçoit suffisamment d'acides humiques et fulviques ainsi que de matières organiques pour le bon développement des plantes, ce qui en fait, avec sa teneur en potasse, un produit idéal pour appliquer en tant que nutriment de fond ou d'arrêt hivernal. Il retient les particules d'eau et les nutriments pendant plus longtemps, ce qui évite le lavage par lixiviation (perte des sels solubles ou dispersibles provoquée par l'eau). Il améliore la masse racinaire de la plante, ce qui augmente la superficie d'absorption et donc l'efficacité de la fertilisation.

CONTENU DÉCLARÉ

Extrait humique total	70,00 % m/m
Acides humiques	65,00 % m/m
Acide fulviques	5,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	6,00 % - 8,00 % m/m

pH : 9-11 (10 % de dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	En irrigation par inondation avec de l'azote, au premier bourgeonnement et développement. En irrigation localisée avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'irrigation.	Radiculaire : 100-150 kg/ha.
Arbres fruitiers	En irrigation par inondation avec de l'azote, au premier bourgeonnement et développement. En irrigation localisée avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'irrigation.	Radiculaire : 100-150 kg/ha.
Fruits tropicaux	En irrigation par inondation avec de l'azote, au premier bourgeonnement et développement. En irrigation localisée avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'irrigation.	Radiculaire : 100-150 kg/ha.
Café	En irrigation par inondation avec de l'azote, au premier bourgeonnement et développement. En irrigation localisée avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'irrigation.	Radiculaire : 100-150 kg/ha.
Horticulture	En tant que nutriment organique de fond, avant la plantation, en appliquant de préférence dans la zone de développement racinaire.	Radiculaire : 100-200 kg/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	En tant que nutriment organique de fond, avant la plantation, en appliquant de préférence dans la zone de développement racinaire.	Radiculaire : 100-200 kg/ha.
Vigne	Appliquer à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Dans des zones de grande production, mélanger avec de l'azote.	Radiculaire : 75-100 kg/ha.
Bananiers	En février et mars, réaliser deux applications.	Radiculaire : 150-200 kg/ha.
Oliviers	En aridoculture, à la fin de l'hiver avec de l'azote. En irrigation localisée avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'irrigation.	Radiculaire : 100-150 kg/ha. Grands arbres : 250-500 g/pied.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Ce produit peut être appliqué avec tout type mécanique servant généralement à appliquer les nutriments minéraux. Maintenir le produit dans un endroit sec et aéré. Même s'il n'est pas nécessaire de l'incorporer au sous-sol pour sa décomposition, il est recommandé de labourer la terre après l'application ou de l'appliquer avec une machine spécialisée.

REACH: 01-2119484861-29-0023

HUMUSPOWER ENERGY

ACIDES HUMIQUES

HUMUSPOWER ENERGY est une innovante formule d'origine végétale composée de léonhardite en provenance de lignites oxydés durant des millions d'années, de sels potassiques totalement solubles et d'azote à libération contrôlée.

Débloccage des nutriments présents au sol. Évite le lavage de l'azote par lixiviation. Produit l'augmentation de la masse racinaire et active la microflore du sol. Améliore la structure du sol, c'est le remplaçant parfait du fumier, de plus il ne produit pas de mauvaises herbes.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	15,75 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	2,00 % m/m
Extrait humique total	17,50 % m/m
Acides humiques	16,25 % m/m
Acides fulviques	1,25 % m/m

pH: 7,8 % (10 % dissolution)

Ce produit, par sa provenance, contient 17,50 % de matière organique et 45 % de Trioxide de soufre (SO₃) soluble dans l'eau.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	En irrigation en première pousse. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 200 - 300 kg/ha
Arbres fruitiers	En irrigation en première pousse. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 200 - 300 kg/ha
Cultures horticoles	En tant que nutriment organique de fond avant la plantation de préférence concentré dans la zone de développement racinaire.	Radiculaire: 300 - 500 kg/ha
Vignes	Appliquer à la fin de l'hiver ou début de printemps.	Radiculaire: 150 - 250 kg/ha
Cultures tropicales	En irrigation en première pousse et grossissement. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 200 - 300 kg/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	En tant que nutriment organique de fond avant la plantation de préférence concentré dans la zone de développement racinaire.	Radiculaire: 300 - 500 kg/ha
Oliviers	En agriculture pluviale a la fin de l'hiver ou début du printemps . En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Grands arbres Radiculaire: 1,5 - 2 kg/tronc
Café	En irrigation en première pousse. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 200 - 300 kg/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Ce produit peut s'appliquer à l'aide de tout type d'élément mécanique traditionnellement utilisé pour appliquer les nutriments minéraux. Maintenir le produit en lieu sec et aéré. Bien que pour sa décomposition il n'est pas nécessaire de l'appliquer au sous sol, il est conseillé de réaliser une culture après l'application ou de l'appliquer avec une machine incorporatrice.

REACH: 01-2119484861-29-0023



HUMUSPOWER PLUS

ENGRAIS AZOTÉ N 20 AVEC ACIDES AMINÉS

HUMUSPOWER PLUS est une innovante formule d'origine végétale composée de léonhardite en provenance de lignites oxydés durant des millions d'années, de sels potassiques totalement solubles et d'azote à libération contrôlée.

Débloccage des nutriments présents au sol. Évite le lavage de l'azote par lixiviation. Produit l'augmentation de la masse racinaire et active la microflore du sol. Améliore la structure du sol, c'est le remplaçant parfait du fumier, de plus il ne produit pas de mauvaises herbes.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	20,00 % m/m
Azote (N) ammoniacal	20,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	1,00 % m/m
Extrait humique total	8,75 % m/m
Acides humiques	8,12 % m/m
Acides fulviques	0,63 % m/m

pH: 7.25 % (10 % dissolution)

Ce produit, par sa provenance, contient 8,75 % de matière organique et 52,50 % de Trioxide de soufre (SO₃) soluble dans l'eau.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	En irrigation en première pousse. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 300 - 400 kg/ha
Arbres fruitiers	En irrigation en première pousse. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 300 - 400 kg/ha
Cultures horticoles	En tant que nutriment organique de fond avant la plantation de préférence concentré dans la zone de développement racinaire.	Radiculaire: 400 - 600 kg/ha
Vignes	Appliquer à la fin de l'hiver ou début de printemps.	Radiculaire: 250 - 350 kg/ha
Cultures tropicales	En irrigation en première pousse et grossissement. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 300 - 400 kg/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	En tant que nutriment organique de fond avant la plantation de préférence concentré dans la zone de développement racinaire.	Radiculaire: 400 - 600 kg/ha
Oliviers	En agriculture pluviale a la fin de l'hiver ou début du printemps. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Grands arbres Radiculaire: 2 - 3 kg/tronc
Café	En irrigation en première pousse. En arrosage localisé avec les pluies d'hiver ou dans la zone d'arrosage.	Radiculaire: 300 - 400 kg/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Ce produit peut s'appliquer à l'aide de tout type d'élément mécanique traditionnellement utilisé pour appliquer les nutriments minéraux. Maintenir le produit en lieu sec et aéré. Bien que pour sa décomposition il n'est pas nécessaire de l'appliquer au sous sol, il est conseillé de réaliser une culture après l'application ou de l'appliquer avec une machine incorporatrice.

REACH: 01-2119484861-29-0023

AGROCÉ HÚMICO WSP

ACIDES HUMIQUES

AGROCE HÚMICO WSP est un concentré d'acides humiques sous forme solide et totalement soluble qui incorpore au sol la substance la plus importante et biologiquement active entre les produits résultant de la décomposition de la matière organique: les acides humiques. Il confère des caractéristiques uniques qui en font un élément indispensable pour tout programme de fertirrigation, aidant à libérer les éléments fertilisants bloqués dans le sol et améliorant considérablement la nutrition racinaire.

CONTENU DÉCLARÉ

Extrait humique total	70,00 % m/m
Acides humiques	60,00 % m/m
Acide fulviques	10,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	12,00-15,00 % m/m
pH: 8-11 (10 % de dissolution)	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	A partir du démarrage végétatif, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	En une irrigation : 1-3 kg/ha. Dose totale : 6-20 kg/ha.
Arbres fruitiers	A partir du démarrage végétatif, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	En une irrigation : 1-3 kg/ha. Dose totale : 6-20 kg/ha.
Fruits tropicaux	A partir du démarrage végétatif, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	En une irrigation : 1-3 kg/ha. Dose totale : 6-20 kg/ha.
Café	A partir du démarrage végétatif, lors de la chute des pétales, pendant la maturation du fruit, jusqu'à 15 jours avant la récolte.	En une irrigation : 1-3 kg/ha. Dose totale : 6-20 kg/ha.
Horticulture	A partir des premières irrigations, pour développer le bulbe racinaire et renforcer la végétation. Pendant le cycle de culture, en renforçant pendant le stress.	En une irrigation : 1-3 kg/ha. Dose totale : 6-20 kg/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	A partir des premières irrigations, pour développer le bulbe racinaire et renforcer la végétation. Pendant le cycle de culture, en renforçant pendant le stress.	En une irrigation : 1-3 kg/ha. Dose totale : 6-18 kg/ha.
Plantes ornementales	Au démarrage végétatif et au début du développement.	En une irrigation : 1-3 kg/ha. Dose totale : 6-15 kg/ha.
Vigne	Au démarrage végétatif et au début du développement.	En une irrigation : 5-8 kg/ha. Dose totale : 6-16 kg/ha.
Oliviers	At the beginning of vegetation and at the beginning of fattening.	En une irrigation : 5-8 kg/ha. Dose totale : 6-16 kg/ha.
Bananiers	Répartir les doses pendant le cycle végétatif en renforçant en période de croissance maximale	En une irrigation : 1-4 kg/ha. Dose totale : 6-25 kg/ha.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit à application racinaire par irrigation ou injection directe. En raison de ses conditions chimiques, il est recommandé de le mélanger uniquement avec des correcteurs de fer, de magnésium, de zinc ou de manganèse. Ne pas mélanger avec des produits phytosanitaires. Pour une bonne application, il est nécessaire de dissoudre le produit avant de l'incorporer à la cuve d'engrais, en agitant énergiquement jusqu'à ce que les grains s'hydratent et se dissolvent parfaitement sans laisser de particules en suspension. Ne pas mélanger avec des produits à pH acide, ni avec du nitrate de calcium ni avec des huiles dérivées du pétrole.

REACH: 01-2119484861-29-0023



AGROCÉ HUMIFER

CHÉLATE DE FER (Fe) EDDHA AUX ACIDES HUMIQUES

AGROCE HUMIFER est un produit combinant des acides humiques d'origine végétale issus de la léonardite, des lignites oxydés pendant des millions d'années et des sels de potassium totalement solubles avec le chélate de fer (Fe) EDDHA. Le processus de synthèse du produit garantit un processus synergique qui augmente les bénéfices qu'apportent les deux composés séparément, avec une action plus rapide et prolongée. Il améliore la masse racinaire de la plante, ce qui augmente la superficie d'absorption et donc l'efficacité de la fertilisation. Il apporte du fer totalement chélaté qui prévient et corrige les carences de cet élément.

CONTENU DÉCLARÉ

Fer (Fe) chélaté par EDDHA soluble dans l'eau	4,00 % m/m
Extrait humique total	23,80 % m/m
Acides humiques	20,40 % m/m
Acide fulviques	3,40 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	4,10-5,10 % m/m
pH: 9-11 (10 % de dissolution)	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 20-60 g par plante.
Fruits à noyau et pépins	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 20-60 g par plante.
Vigne	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-10 g par plante.
Bananiers	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-12 g par plante.
Fruits tropicaux	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 20-60 g par plante.
Oliviers	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 10-40 g par plante.
Café	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-10 g par plante.
Plantes ligneuses	En prévention au début du bourgeonnement et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 2-5 g/m ² .
Plants et jeunes plantes ligneuses	En prévention au début du bourgeonnement et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-15 g par plante.
Fruits des bois, framboises, etc.	En prévention au début du bourgeonnement et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 0,5-2 g/m ² .
Plantes ornementales	En prévention au début du bourgeonnement et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 2-5 g/m ² .
Fraisiers	En prévention au début du bourgeonnement et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 0,5-2 g par plante.
Horticulture	Pendant tout le cycle végétatif et en carence évidente.	Radiculaire : 0,5 à 1,5 g/m ² .

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Ne pas mélanger avec des produits à pH acide, ni avec du nitrate de calcium ni avec des huiles dérivées du pétrole.

AGROCÉ CALCISAN

SOLUTION DE CALCIUM (CA) (10) COMPLEXÉ PAR ACIDE LIGNOSULFONIQUE

AGROCE CALCISAN est un correcteur de carences de calcium complexé par une combinaison exclusive de plusieurs acides organiques, formulés dans des proportions optimales pour obtenir un haut rendement et caractérisés par leur haute efficacité, grâce à leur faible poids moléculaire, et un bon rapport entre les groupes carboxyles et alcools des molécules et la taille des molécules.

AGROCE CALCISAN permet de lutter contre la salinité de l'eau et des sols salino-sodiques grâce à son apport en calcium complexé et la réaction continue de ses acides organiques sur le sol pour libérer le calcium. Il déplace le sodium absorbé par les argiles en le remplaçant par du calcium, ce qui évite la salinisation sodique du sol et la destruction de la structure du sol.

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau	10,00 % m/m
Oxyde de calcium (CaO) complexé	10,00 % m/m
Agent complexant : Acide lignosulfonique	
pH : 3-5 – Densité : 1,25-1,35 g/cc	
Ce produit contient par nature 17 % de matière organique et 24 % d'acides polyhydroxycarboxyliques.	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 4-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Arbres fruitiers	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 4-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Fruits tropicaux	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 4-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Horticulture	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 3-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 3-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Vigne	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 3-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Bananiers	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 4-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Plantes ornementales	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 3-6 l/ha.
Oliviers	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 4-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.
Café	Une première application avec une forte dose, puis des doses de maintien tous les 8-15 jours pendant la culture.	Plantation : 1-2 cc/plante. Plante moyenne : 4-6 l/ha. Plante adulte : 5-10 l/ha.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

En forte concentration saline, appliquer 20 l/ha, puis commencer l'application de maintien 8 jours après. L'application d' **AGROCÉ HÚMICOS LÍQUIDOS** est fortement recommandée en irrigation alternée.



C-ACTIV-PLUS

ENGRAIS AVEC ACIDES AMINÉS

C-ACTIV-PLUS est un produit de haute technologie qui stimule de façon explosive le nombre de racines secondaires dans les cultures et renforce le système de défense de la plante. En situation de stress dans une culture, la force du produit stimulera très rapidement la plante. Toute plante ayant un bon système racinaire est beaucoup plus forte face aux attaques des champignons ou des insectes. Un système racinaire renforcé favorise l'assimilation des nutriments du sol.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	0,60 % m/m
Azote (N) organique	0,60 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	7,00 % m/m
Extrait humique total	63,00 % m/m
Acides humiques	9,00 % m/m
Acide fulviques	54,00 % m/m
Acides aminés libres	4,00 % m/m
pH: 3-5 (dissolution 10 %)	

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,29. Alanine : 0,19. Cystéine : 0,10. Glycine : 0,35. Isoleucine : 0,19. Lysine : 0,07. Proline : 0,44. Tyrosine : 0,04. Valine : 0,33. Acide glutamique : 0,44. Arginine : 0,28. Phénylalanine : 0,21. Histidine : 0,03. Leucine : 0,32. Méthionine : 0,02. Sérine : 0,51. Thréonine : 0,19.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer en début de bourgeonnement, principalement sur les plants, plantes fatiguées par la lenteur de la production dans la culture ou souffrant de stress.	Radiculaire: 1-2 applications, 5-6 kg/ha chacune.
Arbres fruitiers	Appliquer en début de bourgeonnement, principalement sur les plants, plantes fatiguées par la lenteur de la production dans la culture ou souffrant de stress.	Radiculaire: 1-2 applications, 5-6 kg/ha chacune.
Vigne	Appliquer en début de bourgeonnement, principalement sur les plants, plantes fatiguées par la lenteur de la production dans la culture ou souffrant de stress.	Radiculaire: 1-2 applications, 5-6 kg/ha chacune.
Bananiers	Appliquer en début de bourgeonnement, principalement sur les plants, plantes fatiguées par la lenteur de la production dans la culture ou souffrant de stress.	Radiculaire: 1-3 applications, 5-6 kg/ha chacune.
Fruits tropicaux	Appliquer en début de bourgeonnement, principalement sur les plants, plantes fatiguées par la lenteur de la production dans la culture ou souffrant de stress.	Radiculaire: 1-2 applications, 5-6 kg/ha chacune.
Horticulture	En début de croissance et en période critique de besoin maximal des plantes.	Radiculaire: 1-3 applications, 5-6 kg/ha chacune.
Fruits des bois, framboises, etc.	En début de croissance et en période critique de besoin maximal des plantes.	Radiculaire: 1-3 applications, 5-6 kg/ha chacune.
Plantes ornementales	En début de croissance et en période critique de besoin maximal des plantes.	Radiculaire: 1-3 applications, 5-6 kg/ha chacune.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Dissoudre au préalable. Commencer l'application dans la deuxième partie de l'irrigation. Maintenir le produit dans un endroit frais et aéré. Maintenir les récipients fermés.



La gamme Micronutrition est constituée de produits de nutrition végétale, microéléments et éléments secondaires chélatés par différentes molécules organiques.

La base d'une bonne fertilisation qui assure de bons rendements doit être la prévention, puisque bien que ces éléments sont demandés en moindre quantité par les cultures, ils sont aussi nécessaires que les macroéléments pour assurer une correcte santé de la plante et faire en sorte que celle-ci atteigne son niveau productif optimum.

3

MICRONUTRITION DE PRÉCISION

AGROCÉ BORO
AGROCÉ BORMI
AGROCÉ CALCIO 10
AGROCÉ CALCIO + AA
AGROCÉ CALIBOR
AGROCÉ Fe EDDHA
AGROCÉ Fe-L
AGROCÉ NUTRICE HIERRO
AGROCÉ MAGNESIO
AGROCÉ MAGNESIO + AA
AGROCÉ MANGANESO
AGROCÉ NUTRICE MANGANESO
AGROCÉ ZINC
AGROCÉ NUTRICE ZINC
AGROCÉ BOROPLUS MAGNESIO
AGROCÉ BOROPLUS Mg-Zn
AGROCÉ NUTRICE N+C+M
AGROCÉ CORRIGE + 3
AGROCÉ Zn+Mn MAXI
AGROCÉ Zn+Mn RADICULAR
AGROCÉ MIX Q-7
AGROCÉ MIXLAND
AGROCÉ MIXTRAL
AGROCÉ MIX Q-6

AGROCÉ BORO

BORE ETHANOLAMINE

AGROCE BORO est un fertilisant « boraté » en solution pour application foliaire. Il prévient et corrige les physiopathologies de cet élément. En général, ces physiopathologies apparaissent dans des sols légers et drainés ou, au contraire, dans des sols calcaires, en période de sécheresse ou de pluie prolongée.

CONTENU DÉCLARÉ

Bore (B) soluble dans l'eau	11,00 % m/m
-----------------------------	-------------

pH: 7,5-8,5 / Densité: 1,30-1,35 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agumes	Lorsque les feuilles atteignent 2/3 de leur taille et 15 jours après.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Arbres fruitiers	Pour éviter les taches amères, les crevasses et le chancre papyracé pendant le cycle de la culture. Pendant le cycle végétatif.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Horticulture	Peut être appliqué en présence de carence évidente ou en prévention, par besoin de la culture.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Fruits tropicaux	Peut être appliqué en présence de carence évidente ou en prévention, par besoin de la culture.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Plantes ornementales	Peut être appliqué en présence de carence évidente ou en prévention, par besoin de la culture.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-300 cc/hl. Radiculaire: 2-3 cc/m ²
Café	Peut être appliqué en présence de carence évidente ou en prévention, par besoin de la culture.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Vigne	Pour améliorer la floraison et éviter la coulure, éviter les fruits petits et fripés, pendant le cycle végétatif.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Fruits des bois, framboises, etc.	Avant et après la floraison.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Oliviers	Perte de production, feuilles couleur tabac et olives déformées, branches séchées. Au printemps.	Prévention : 100-200 cc/hl. Curatif : 250-500 cc/hl.
Luzerne	Après chaque coupe ou en coupes alternées.	1 l/ha.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser le liquide suffisant pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. En application à bas volume appliquer la dose générale. Peut être appliqué seul ou avec des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. La dose générale en extensif sera de 2-4 L/ha., et pour le reste 2-3 L/ha. Respecter les doses indiquées.



AGROCÉ BORMI

BORE ÉTHANOLAMINE AVEC ACIDES AMINÉS

AGROCE BORMI est un mélange de bore en forme monoéthanolamine avec acide aminé qui améliore l'absorption de ce micronutriment par le tissu, ce qui influe sur plusieurs processus biochimiques et physiologiques de la plante. Le niveau de bore optimal dans le tissu végétal permet d'améliorer la viabilité du pollen ce qui affecte directement la floraison. Dans la phase de croissance des fruits le bore intervient dans l'amélioration de l'élasticité du tissu évitant les cassures et dans la maturation il favorise la translocation de sucres des feuilles vers les fruits augmentant leur rendement.

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	3,00 % m/m
Azote (N) total	2,81 % m/m
Azote (N) organique	2,64 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	7,00 % m/m
pH: 7,5-8,5 / Densité: 1,28 g/cc	

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,21, Acide glutamique : 0,32, Alanine : 0,11, Arginine : 0,15, Cystéine : 0,08, Phénylalanine : 0,11, Glycine : 0,49, Isoleucine : 0,09, Histidine : 0,07, Leucine : 0,20, Lysine : 0,10, Proline : 0,33, Sérine : 0,32, Tyrosine : 0,03, Thréonine : 0,27, Valine : 0,12.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Dès que les feuilles atteignent 2/3 de leur taille et 15 jours après.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl
Arbres fruitiers	Pour éviter le bitter pit, les craquements et le chancre mou. Pendant le cycle végétal.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl
Cultures horticoles	Peut s'appliquer en cas de carence manifeste ou en préventif par besoin de la culture.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl
Vignes	Pour améliorer la floraison et éviter la coulure de la grappe, éviter des fruits petits et fripés, pendant le cycle végétatif.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl
Cultures tropicales	Peut être appliqué en cas de carence manifeste ou en préventif par besoin de la culture.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl
Fruits rouges, Framboises, etc.	Avant et après la floraison.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl
Pépinières ornementales	Peut être appliqué en cas de carence manifeste ou en préventif par besoin de la culture.	Foliaire: 100-200 cc/hl Radiculaire: 2-3 cc/m ²
Oliviers	Baisse de production, feuille de couleur tabac et olives déformées, assèchement des branches. Au printemps.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl Extra: 500-600 cc/hl
Café	Peut être appliqué en cas de carence manifeste ou en préventif par besoin de la culture.	Préventif: 100-200 cc/hl Curatif: 250-350 cc/hl
Luzerne	Après chaque coupe ou en coupes alternées.	1 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser le liquide suffisant pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. En application à bas volume appliquer la dose générale. Peut être appliqué seul ou avec des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. La dose générale en extensif sera de 2-4 L/ha., et pour le reste 2-3L/ha. Respecter les doses indiquées.

AGROCE CALCIO 10

SOLUTION AZOTÉE N6 AVEC CALCIUM (Ca) (10)

AGROCE CALCIO 10 est un correcteur de carence de calcium qui contient de la LEBBINA (composition organique à groupes carboxyles qui coexistent avec les ions métalliques favorisant leur assimilation) pour combattre et prévenir les carences nutritionnelles provoquées par la carence de calcium. Il va contribuer au parfait développement de la plante, couvrant les besoins de calcium indispensable pour obtenir une culture de première qualité. Stabilise et fortifie les parois cellulaires pour empêcher la dégradation des tissus quand la maturité commence.

La déficience s'observe dans les zones de croissance et dans les feuilles jeunes. Celles-ci deviennent déformées et chlorotiques et, dans les stades les plus avancés de la carence, la nécrose apparaît au bord des feuilles. Les tissus affectés deviennent mous à cause de la dissolution des parois cellulaires. Des substances marrons qui s'accumulent dans les espaces intercellulaires apparaissent.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	6,00 % m/m
Azote (N) nitrique	6,00 % m/m
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau	10,00 % m/m

pH: 1-2 / Densité: 1,22-1,26 g/cc

Le produit contient de la LEBBINA comme améliorateur des principes actifs.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	En préventif au début de l'été et pour prévenir les craquements en variétés sensibles et pendant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-30 L/ha
Arbres fruitiers	En préventif au début de l'été pour prévenir le bitter-pit pour les variétés sensibles et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-30 L/ha
Cultures horticoles	En préventif dès les premières fleurs pour prévenir les craquements pour les variétés sensibles et pendant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-36 L/ha Générale: 2-3 L/ha chaque application
Vignes	En cas de besoin appliquer en préventif au début de l'été ou en curatif à l'apparition de la carence.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Irrigation: 12-20 L/ha
Bananiers	Appliquer pendant le cycle végétatif en plusieurs arrosages.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-40 L/ha
Cultures tropicales	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif de préférence en début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-30 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc.	En préventif dès les premières fleurs pour prévenir le craquement pour les variétés sensibles et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-36 L/ha Générale: 2-3 L/ha chaque application
Pépinières ornementales	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif de préférence en floraison.	Irrigation: 2-3 cc/m ²
Oliviers	Peut s'appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-24 L/ha
Café	Peut s'appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-30 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser le liquide suffisant pour appliquer la dose générale de 2-3 L/ha., en application à bas volume appliquer la dose maximale. Peut être appliqué seul ou avec des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable.



AGROCÉ CALCIO + AA

SOLUTION AZOTÉE N 7.8 AVEC CALCIUM (Ca) (9,8) AVEC ACIDES AMINÉS

AGROCE CALCIO + AA est un correcteur de carence de calcium pour combattre et prévenir les carences nutritionnelles provoquées par la carence de calcium (Ca). Il contient des acides aminés essentiels qui facilitent et améliorent l'absorption de calcium. Il va contribuer au parfait développement de la plante, couvrant les besoins de calcium indispensable pour réussir à une culture de première qualité. Il stabilise et fortifie les parois cellulaires pour empêcher la dégradation des tissus lorsque s'initie la maturité des tissus. La carence s'observe dans les zones de croissance et dans les jeunes feuilles. Celles-ci deviennent déformées et chlorotiques et, pour les stades les plus avancés de déficience, la nécrose apparaît aux bords des feuilles. Les tissus affectés deviennent mous à cause de la dissolution des parois cellulaires, des substances marrons qui s'accumulent dans les espaces intercellulaires apparaissent.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) Total	7,80 % m/m
Azote (N) Nitrique	6,40 % m/m
Azote (N) Organique	1,00 % m/m
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau	9,50 % m/m
Acides aminés libres	4,60 % m/m
pH: 3-4 / Densité: 1,28-1,32 g/cc	

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,46, Acide glutamique : 1,13, Sérine : 0,25, Histidine : 0,24, Glycine : 0,27, Thréonine : 0,07, Arginine : 0,33, Alanine : 0,33, Tyrosine : 0,075, Valine : 0,24, Méthionine : 0,06, Isoleucine : 0,05, Phénylalanine : 0,26, Leucine : 0,20, Lysine : 0,33, Hydroxyproline : 0,08, Proline : 0,23.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-24 L/ha
Arbres fruitiers	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-24 L/ha
Cultures horticoles	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-36 L/ha
Vignes	En cas de besoin appliquer en préventif aux premières pousses et en curatif à l'apparition de la carence.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-24 L/ha
Bananiers	En cas de besoin appliquer en préventif aux premières pousses et en curatif à l'apparition de la carence.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-36 L/ha
Cultures tropicales	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-24 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc.	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-36 L/ha
Pépinières ornementales	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation: 2-3 cc/m ³
Oliviers	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-24 L/ha
Café	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début de printemps et été.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-24 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser le liquide suffisant pour appliquer la dose générale de 2-3 L/ha., en application à bas volume appliquer la dose générale. Peut être appliqué seul ou avec des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable.

AGROCE CALIBOR

SOLUTION DE CALCIUM (Ca) (10) AVEC

AGROCE CALIBOR est un correcteur de calcium/bore contenant de la LEBBINA (composé organique ayant des groupes carboxyles qui coexistent avec les ions métalliques favorisant l'assimilation) pour combattre et prévenir les carences nutritionnelles provoquées par le manque de ces éléments. Il améliore la nouaison des fruits. Le bore favorise l'assimilation rapide du calcium afin de le déplacer dans les plus jeunes organes de la culture.

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau	10,00 % m/m
---	-------------

Bore (B) soluble dans l'eau	1,00 % m/m
-----------------------------	------------

pH: 3,5-4,5 / Densité: 1,30-1,35 g/cc

Ce produit contient de la LEBBINA comme améliorateur des principes actifs.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	En prévention au début de l'été pour prévenir la fente chez les variétés sensibles et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Arbres fruitiers	En prévention, appliquer au début de l'été pour prévenir les taches amères chez les variétés sensibles et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Horticulture	En prévention, appliquer à l'apparition des premières fleurs pour prévenir la fente chez les variétés sensibles et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-36 l/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	En prévention, appliquer à l'apparition des premières fleurs pour prévenir la fente chez les variétés sensibles et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-36 l/ha.
Vigne	En cas de besoin, appliquer en prévention au début de l'été, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha. Irrigation : 12-20 l/ha.
Bananiers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif en plusieurs irrigations.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-40 l/ha.
Fruits tropicaux	Pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Oliviers	Pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-24 l/ha.
Café	Pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Plantes ornementales	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation : 2-3 cc/m ² .

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser le bouillon suffisant pour appliquer la dose générale de 2-3 l/ha. En application à faible volume, appliquer la dose maximale. Peut être appliqué seul ou avec des produits phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable.

Fe 4,8
Fe 3,2
Fe 2,0

AGROCE Fe EDDHA

CHÉLATE DE FER (Fe) EDDHA

AGROCE Fe-EDDHA est une formule granulée et micronisée WSP totalement soluble, à très haute pureté, spécialement indiquée pour corriger la chlorose ferrique, la carence de fer, pour les sols basiques en irrigation localisée ou tout autre système.

AGROCE Fe-EDDHA est efficace dans les cultures fruitières, horticoles, florales, tropicales et ornementales.

La même teneur en fer, mais sous différentes formes ortho/ortho selon l'alcalinité du sol de la culture. Plus le pH du sol est élevé, plus la teneur en isomère ortho/ortho doit être grande.

CONTENU DÉCLARÉ

	Fe 4,8	Fe 3,2	Fe 2,0
Fer (Fe) soluble dans l'eau	6,00 % m/m	6,00 % m/m	6,00 % m/m
Fer (Fe) chélaté par EDDHA	6,00 % m/m	6,00 % m/m	6,00 % m/m
Fer (Fe) chélaté par EDDHA (isomère ortho/ortho)	4,80 % m/m	3,20 % m/m	2,00 % m/m

pH: 8,9 (10 % de dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 20-60 g par plante.
Fruits à noyau et pépins	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 20-60 g par plante.
Vigne	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-10 g par plante.
Bananiers	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-12 g par plante.
Fruits tropicaux	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 20-60 g par plante.
Oliviers	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 10-40 g par plante.
Café	Adultes. Début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-10 g par plante.
Horticulture	Pendant le cycle végétatif et en carence évidente.	Radiculaire : 0,5-1,5 g/m ² .
Plantes ligneuses	Appliquer en début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 2-5 g/m ² .
Plants et jeunes plantes	Appliquer en début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 3-15 g par plante.
Fruits des bois, framboises, etc.	Appliquer en début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 0,5-2 g/m ² .
Plantes ornementales	Appliquer en début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 2-5 g/m ² .
Fraisiers	Appliquer en début de bourgeonnement en prévention et pendant le cycle en carence évidente.	Radiculaire : 0,5-2 g par plante.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

En raison de ses conditions physico-chimiques, le produit peut être appliqué dans tout type de système d'irrigation et en injection directe. Une dilution préalable est recommandée pour une hydratation parfaite du produit. Dans ce cas, appliquer dans les plus brefs délais. En cas d'application directe, irriguer après l'injection. Pour une efficacité et une durabilité accrues du produit, il est fortement recommandé de l'appliquer conjointement avec **AGROCE HUMICOS LIQUIDOS**.

AGROCE Fe-L

SOLUTION D'ENGRAIS À BASE DE FER (Fe) EN PROVENANCE DE SULFATE

AGROCE Fe-L est un correcteur de carence de fer (Fe) en forme liquide pour application foliaire qui contient de la LEBBINA (composé organiques avec des groupes carboxyles qui coexistent avec les ions métalliques favorisant leur assimilation) ce qui permet que le fer soit assimilé par voie foliaire par la culture et la carence s'élimine de façon immédiate.

CONTENU DÉCLARÉ

Fer (Fe) soluble dans l'eau	7,00 % m/m
-----------------------------	------------

pH: 3-4 / Densité: 1,20-1,25 g/cc

Le produit contient de la LEBBINA comme améliorateur des principes actifs.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes et Fruits à noyaux ou graines	Adultes. Début de pousse en préventif et durant le cycle en carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Plantes ligneuses	Au début de pousse en préventif et durant le cycle de carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Cultures horticoles	Durant le cycle en végétatif et en carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Vignes	Adultes. Début de pousse en préventif et durant le cycle en carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Bananiers	Adultes. Début de pousse en préventif et durant le cycle en carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Cultures tropicales	Adultes. Début de pousse en préventif et durant le cycle en carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Fruits rouges, Framboises, etc.	Au début de pousse en préventif et durant le cycle de carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Pépinières ornementales	Au début de pousse en préventif et durant le cycle de carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Oliviers	Adultes. Début de pousse en préventif et durant le cycle en carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl
Café	Adultes. Début de pousse en préventif et durant le cycle en carence manifeste.	Préventif Foliaire: 250-350 cc/hl Curatif Foliaire: 500-750 cc/hl

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser le liquide suffisant pour appliquer la dose générale de 2-3 L/ha. Peut être appliqué seul ou avec des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable.



AGROCE NUTRICE HIERRO

CHÉLATE DE FER (Fe) EDTA

AGROCE NUTRICE HIERRO est un correcteur solide chélaté par EDTA pour combattre et prévenir les carences de fer (Fe). Il peut être appliqué par voie foliaire ou radiculaire. L'agent chélatant EDTA est un chélate stable dans un intervalle de stabilité compris entre 4 et 7,5.

CONTENU DÉCLARÉ

Fer (Fe) soluble dans l'eau	13,00 % m/m
Fer (Fe) chélaté par EDDHA	13,00 % m/m
pH: 4-5 (1 % de dissolution)	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Arbres fruitiers	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Fruits tropicaux	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Café	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Horticulture	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment en bourgeonnement.	Foliaire : 75-100 g/hl. Irrigation : 4-8 kg/ha.
Vigne	En cas de besoin, appliquer en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Bananiers	En cas de besoin, appliquer en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Pendant tout le cycle végétatif de préférence en floraison.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Plantes ornementales	Pendant tout le cycle végétatif de préférence en floraison.	Irrigation : 2-3 g/m ² .

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser le bouillon suffisant pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Peut être appliqué seul ou avec des produits phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable. En application foliaire, ne jamais traiter à des températures supérieures à 25 °C.

AGROCE MAGNESIO

SOLUTION DE MAGNÉSIUM (Mg) (6) COMPLEXÉ PAR ACIDE LIGNOSULFONIQUE

AGROCE MAGNESIO est formulé pour une application dans tout type de culture ayant des besoins de magnésium. En raison de sa composition, il peut être appliqué par voie foliaire ou par fertirrigation. Il facilite l'absorption et le transport d'autres éléments, comme le phosphore, à des moments précis et importants de la culture. Il ne faut pas oublier que le magnésium est l'un des principaux composants de la chlorophylle.

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
Oxyde de magnésium (MgO) complexé	6,00 % m/m
Agent complexant : Acide lignosulfonique	
pH: 2-4 / Densité: 1,20-1,25 g/cc	
Ce produit contient par nature 5 % de matière organique.	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et pendant tout le cycle végétatif.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Arbres fruitiers	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et pendant tout le cycle végétatif.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Fruits tropicaux	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et pendant tout le cycle végétatif.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Oliviers	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et pendant tout le cycle végétatif.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-24 l/ha.
Café	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et pendant tout le cycle végétatif.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-30 l/ha.
Horticulture	En prévention dès les premières fleurs et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-36 l/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	En prévention dès les premières fleurs et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-36 l/ha.
Vigne	En cas de besoin, appliquer en prévention au début de l'été, ou en Curatif avant et après la floraison.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-20 l/ha.
Bananiers	Peut être appliqué pendant le cycle végétatif en plusieurs irrigations.	Foliaire : 250-350 cc/hl. Irrigation : 12-40 l/ha.
Plantes ornementales	Pendant tout le cycle végétatif de préférence en floraison.	Irrigation : 2-3 cc/m².

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser le bouillon suffisant pour appliquer la dose générale de 2-3 l/ha. En application à faible volume, appliquer la dose maximale. Peut être appliqué seul ou avec des produits phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable.



AGROCÉ MAGNESIO + AA

SOLUTION AZOTÉE N 8.8 AVEC MAGNÉSIUM (8Mg) (10) ET AVEC ACIDES AMINÉS

AGROCE MAGNESIO + AA est un correcteur de Magnésium (Mg) spécialement préparé pour donner de bons résultats pour tout type de culture. C'est une formulation formée par des acides aminés qui complexent le magnésium. Le processus de formation des complexes organiques métalliques est analogue à ceux qui se forment dans la nature entre les acides aminés et les ions de magnésium.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	8,85 % m/m
Azote (N) nitrique	7,00 % m/m
Azote (N) Organique	1,20 % m/m
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau	10,00 % m/m
Acides aminés libres	6,00 % m/m

pH: 4-5 / Densité: 1,28-1,33 g/cc

AMINOGRAMME % (m/m)

Acide aspartique : 0,59, Acide glutamique : 1,47, Sérine : 0,32, Histidine : 0,31, Glycine : 0,35, Thréonine : 0,09, Arginine : 0,43, Alanine : 0,43, Tyrosine : 0,10, Valine : 0,31, Méthionine : 0,08, Isoleucine : 0,06, Phénylalanine : 0,36, leucine : 0,27, Lysine : 0,43, Hydroxyproline : 0,10, Proline : 0,30.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et durant le cycle végétatif.	Foliaire: 250-350 cc/hl Radiculaire: 12-30 L/ha
Arbres fruitiers	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et durant le cycle végétatif.	Foliaire: 250-350 cc/hl Radiculaire: 12-30 L/ha
Cultures horticoles	En préventif dès les premières fleurs et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha chaque application Radiculaire: 12-36 L/ha
Vignes	En cas de besoin appliquer en préventif au début de l'été ou en curatif avant ou après la floraison.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 12-20 L/ha
Bananiers	Appliquer durant le cycle végétatif en plusieurs arrosages.	Foliaire: 250-350 cc/hl Radiculaire: 12-40 L/ha
Cultures tropicales	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et durant le cycle végétatif.	Foliaire: 250-350 cc/hl Radiculaire: 12-30 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc.	En préventif dès les premières fleurs et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha chaque application Radiculaire: 12-36 L/ha
Pépinières ornementales	Peut s'appliquer durant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Radiculaire: 2-3 cc/m ²
Oliviers	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et durant le cycle végétatif.	Foliaire: 250-350 cc/hl Radiculaire: 12-24 L/ha
Café	Peut être appliqué au début du printemps, à la fin de l'été et durant le cycle végétatif.	Foliaire: 250-350 cc/hl Irrigation: 12-30 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Ce produit permet son mélange avec la plupart de produits phytosanitaires, cependant il est conseillé de réaliser un essai au préalable.

AGROCÉ MANGANESO

SOLUTION DE MANGANÈSE (Mn) COMPLEXÉ PAR ACIDE LIGNOSULFONIQUE

AGROCE MANGANESO est un correcteur liquide complexé par lignosulfonate pour combattre et prévenir les carences de manganèse (Mn).

CONTENU DÉCLARÉ

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	8,00 % m/m
Manganèse (Mn) complexé	8,00 % m/m

Agent complexant : Acide lignosulfonique
pH : 6-7 – Densité : 1,32-1,35 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au printemps et en été, ainsi qu'au début de l'automne, si nécessaire.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-20 l/ha.
Arbres fruitiers	Appliquer au printemps et en été.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-20 l/ha.
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-300 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-20 l/ha.
Fruits tropicaux	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-20 l/ha.
Oliviers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-20 l/ha.
Café	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-20 l/ha.
Vigne	Appliquer avant et après la floraison, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-20 l/ha.
Bananiers	Peut être appliqué pendant le cycle végétatif en plusieurs irrigations.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-20 l/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Appliquer en prévention dès les premières fleurs et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 200-300 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-20 l/ha.
Plantes ornementales	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation : 2-3 cc/m ² .

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser la bouillie suffisante pour appliquer la dose générale de 2-3 l/ha. En application à faible volume, appliquer la dose maximale. Peut être mélangé dans la cuve d'engrais avec les NPK composés ou simples, à l'exception de l'acide phosphorique. Peut être appliqué seul ou avec des produits phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable. En application radiculaire, mélanger avec des acides aminés, des matières organiques ou des acides humiques.

AGROCE NUTRICE MANGANESO

CHÉLATE DE MANGANÈSE (Mn) EDTA

AGROCE NUTRICE MANGANESO est un correcteur solide chélaté par EDTA pour combattre et prévenir les carences de manganèse (Mn). Il peut être appliqué par voie foliaire ou radiculaire. L'agent chélatant EDTA est un chélate stable dans un intervalle de stabilité compris entre 4 et 6,5.

CONTENU DÉCLARÉ

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	13,00 % m/m
Manganèse (Mn) chélaté EDTA	13,00 % m/m

Agent chélatant: EDTA
pH : 6-7 (10 % de dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Arbres fruitiers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Fruits tropicaux	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Café	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en bourgeonnement.	Foliaire : 75-100 g/hl. Irrigation : 4-8 kg/ha.
Vigne	En cas de besoin, appliquer en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Bananiers	En cas de besoin, appliquer en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 6-12 kg/ha.
Plantes ornementales	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation : 2-3 g/m ² .

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser le bouillon suffisant pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Peut être appliqué seul ou avec des produits phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable. En application foliaire, ne jamais traiter à des températures supérieures à 25 °C.

AGROCE ZINC

SOLUTION DE ZINC (Zn) COMPLEXÉ PAR ACIDE LIGNOSULFONIQUE

AGROCE ZINC est un correcteur liquide complexé par lignosulfonate pour combattre et prévenir les carences de zinc (Zn).

CONTENU DÉCLARÉ

Zinc (Zn) soluble dans l'eau	8,00 % m/m
Zinc (Zn) complexé	8,00 % m/m

Agent complexant : Acide lignosulfonique
pH: 6-7 / Densité: 1,32-1,35 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au printemps et en été, ainsi qu'au début de l'automne, si nécessaire.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-25 l/ha.
Arbres fruitiers	Appliquer au printemps et en été.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-25 l/ha.
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-300 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-20 l/ha.
Fruits tropicaux	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-25 l/ha.
Oliviers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-25 l/ha.
Café	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-25 l/ha.
Vigne	Appliquer avant et après la floraison, en prévention comme en Curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-20 l/ha.
Bananiers	Peut être appliqué pendant le cycle végétatif en plusieurs irrigations.	Foliaire : 200-250 cc/hl. Irrigation : 12-20 l/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Appliquer en prévention dès les premières fleurs et pendant tout le cycle végétatif pour les carences évidentes.	Foliaire : 200-300 cc/hl. Générale : 2-3 l/ha par application. Irrigation : 12-25 l/ha.
Plantes ornementales	Appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation : 2-3 cc/m².

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser la bouillie suffisante pour appliquer la dose générale de 2-3 l/ha. En application à faible volume, appliquer la dose maximale. Peut être mélangé dans la cuve d'engrais avec les NPK composés ou simples, à l'exception de l'acide phosphorique. Peut être appliqué seul ou avec des produits phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable. En application radiculaire, mélanger avec des acides aminés, des matières organiques ou des acides humiques.

AGROCÉ NUTRICE ZINC

CHÉLAT DE ZINC (Zn) EDTA

AGROCE NUTRICE ZINC est un correcteur solide avec EDTA pour combattre et prévenir les carences de Zinc (Zn). Il peut s'appliquer par voie foliaire et radiculaire. L'agent chélatant EDTA chélaté est un chélat stable dans un intervalle de stabilité 4-7,5.

CONTENU DÉCLARÉ

Zinc (Zn) soluble dans l'eau	15,00 % m/m
Zinc (Zn) EDTA chélaté	15,00 % m/m

Agent chélatant : EDTA
pH: 7-8 (10 % dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 6-12 kg/ha
Arbres fruitiers	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 6-12 kg/ha
Cultures horticoles	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif de préférence pendant la pousse.	Foliaire: 75-100 g/hl Radiculaire: 4-8 kg/ha
Vignes	En cas de besoin appliquer en préventif aux premières bourgeons ou en curatif à l'apparition de la carence.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 6-12 kg/ha
Bananiers	En cas de besoin appliquer en préventif aux premières bourgeons ou en curatif à l'apparition de la carence.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 6-12 kg/ha
Cultures tropicales	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 6-12 kg/ha
Fruits rouges, Framboises, etc.	Peut s'appliquer durant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 6-12 kg/ha
Pépinières ornementales	Peut s'appliquer durant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Radiculaire: 2-3 g/m ²
Café	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 6-12 kg/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Même qu'il puisse s'appliquer par voie foliaire ce produit est préparé pour son application radiculaire. Il est conseillé d'utiliser le liquide suffisant pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Peut être appliqué seul ou associé à des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. En application foliaire ne jamais traiter à des températures supérieures à 25 °C.

AGROCÉ BOROPLUS MAGNESIO

MAGNÉSIUM (Mg) (11) COMPLEXÉ PAR ACIDE LIGNOSULFONIQUE ET AVEC BORE (B)

AGROCE BOROPLUS MAGNESIO est un mélange solide de bore et de magnésium totalement soluble et préparé pour être assimilé par la plante. Le bore est un élément fondamental pour la nouaison du fruit et le magnésium est le principal composant de la chlorophylle. L'union des deux éléments favorise la formation du fruit. Il s'applique à partir du démarrage végétatif de la culture jusqu'à la nouaison afin de préparer la culture à obtenir davantage de fruits.

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau	11,00 % m/m
Oxyde de magnésium (MgO) complexé	11,00 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	11,00 % m/m

Agent complexant : Acide lignosulfonique
pH : 5-6 (10 % de dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Lorsque les feuilles atteignent 2/3 de leur taille et 15 jours après.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Arbres fruitiers	En préfloraison, en présence de carence évidente ou en prévention, par besoin de la culture.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Horticulture	Appliquer en présence de carence évidente ou en prévention selon les besoins de la culture.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Vigne	Appliquer en présence de carence évidente ou en prévention selon les besoins de la culture.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Fruits tropicaux	Appliquer en présence de carence évidente ou en prévention selon les besoins de la culture.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Plantes ornementales	Appliquer en présence de carence évidente ou en prévention selon les besoins de la culture.	Foliaire : 100-200 g/hl.
Café	Appliquer en présence de carence évidente ou en prévention selon les besoins de la culture.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Fruits des bois, framboises, etc.	Avant et après la floraison.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Oliviers	En prévention au début du bourgeonnement, en Curatif pendant n'importe quel cycle de la culture.	Foliaire : 150-250 g/hl.
Luzerne	Après chaque coupe ou en coupes alternées.	Foliaire : 1 kg/ha.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser le liquide suffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Peut être appliqué seul ou avec des produits phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable. Respecter les doses indiquées.



AGROCÉ BOROPLUS Mg-Zn

MAGNÉSIUM (Mg) (5), BORE (B) ET ZINC (Zn) COMPLÉXÉS PAR ACIDE LIGNOSULPHO-

AGROCE BOROPLUS Mg-Zn est un mélange solide de bore, magnésium et zinc totalement soluble et préparé pour être assimilé par la plante. Le bore est un élément fondamental dans la nouaison du fruit et le magnésium est le composant principal de la chlorophylle. L'union de ces deux éléments aide à la formation du fruit. Le zinc est fondamental dans le métabolisme participant à la formation de chlorophylle, des auxines et des hormones de croissance. Nous soulignons la richesse en soufre pour réaliser une nutrition complète. Son application se fera dès le démarrage végétatif de la culture jusqu'à la nouaison, pour que l'arbre puisse ainsi obtenir un plus grand nombre de fruits.

CONTENU DÉCLARÉ

Bore (B) soluble dans l'eau	8,00 % m/m
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau et complexé	5,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau et complexé	5,00 % m/m

Agent complexant : Acide Lignosulphonique
pH: 5-6 (5% dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Dès que les feuilles atteignent 2/3 de leur taille et 15 jours après.	Foliaire: 150-250 g/hl
Arbres fruitiers	En préfloraison, avec carence manifeste ou en préventif par besoin de culture.	Foliaire: 150-250 g/hl
Horticulture	Peut être appliqué avec carence manifeste ou en état préventif par besoin de la culture.	Foliaire: 150-250 g/hl
Vigne	Peut être appliqué avec carence manifeste ou en état préventif par besoin de la culture.	Foliaire: 150-250 g/hl
Bananiers	Au démarrage végétatif, lorsqu'il y aura une plus grande montée de sève et aux moments de stress. En début et phase finale de grossissement. En application radiculaire au moment du remplissage des fruits.	Foliaire: 250-350 g/hl Dose générale: 2-3 kg/ha
Cultures tropicales	Peut être appliqué avec carence manifeste ou en état préventif par besoin de la culture.	Foliaire: 150-250 g/hl
Fruits rouges, framboises, etc.	Avant et après la floraison.	Foliaire: 150-250 g/hl
Pépinières ornementales	Peut être appliqué avec carence manifeste ou en état préventif par besoin de la culture.	Foliaire: 100-200 g/hl
Oliviers	En préventif au début de la pause, curatif tous les cycles de culture.	Foliaire: 150-250 g/hl
Café	Peut être appliqué avec carence manifeste ou en état préventif par besoin de la culture.	Foliaire: 150-250 g/hl
Luzerne	Après chaque coupe ou en coupes alternatives.	Foliaire: 1 Kg/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose suffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Peut s'appliquer seul ou associé à des traitements phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. Respecter les doses indiquées.

AGROCE NUTRICE N+C+M

SOLUTION AZOTÉE N10 AVEC CALCIUM (Ca) (11) ET MAGNÉSIUM (Mg) (5)

AGROCE NUTRICE N+C+M est un correcteur de calcium, magnésium renforcé avec de l'azote orienté aux cultures à grandes exigences de ses éléments : Le calcium exerce un rôle fondamental pour la plante. Il forme partie active des feuilles, tiges, racines et fruits. C'est le responsable de la rigidité des parois cellulaires. Le magnésium joue un rôle fondamental dans la photosynthèse, puisqu'il est partie constituante de la chlorophylle qui influe sur la nouaison des fruits. Il améliore les pousses rendant la croissance équilibrée et consistante préparant la culture pour un plus grand développement.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	10,00 % m/m
Azote (N) nitrique	10,00 % m/m
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau	11,00 % m/m
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau	5,00 % m/m

pH: 1-2 / Densité: 1,35-1,45 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	En préventif au début de l'été pour prévenir la fente des variétés sensibles et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 350-500 g/hl Radiculaire: 12-40 L/ha
Arbres fruitiers	En préventif au début de l'été pour prévenir le bitter-pit des variétés sensibles et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 350-500 g/hl Radiculaire: 12-40 L/ha
Horticulture	En préventif dès les premières fleurs pour prévenir la fente des variétés sensibles et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 300-350 cc/hl Générale: 3-4 L/ha chaque application Radiculaire: 12-40 L/ha
Cultures tropicales	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire: 350-500 cc/hl Radiculaire: 12-40 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	En préventif dès les premières fleurs pour prévenir la fente des variétés sensibles et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 300-350 g/hl Générale: 3-4 L/ha chaque application Radiculaire: 12-40 L/ha
Oliviers	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire: 350-500 g/hl Radiculaire: 12-40 L/ha
Café	Peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et de l'été.	Foliaire: 350-500 g/hl Radiculaire: 12-40 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose suffisante pour appliquer la dose générale de 3-4 L/ha, en applications à faible volume appliquer la dose générale. Ne pas mélanger à des sulfates ou phosphates. Pour des futures molécules de phytosanitaires faire un essai avant le mélange ou consulter le département technique. Même si le produit se présente en état liquide, du à sa densité la dose se fera en kilos



AGROCÉ CORRIGE + 3

SOLUTION DE MAGNÉSIUM (Mg) (2,5) AVEC MANGANÈSE (Mn) ET ZINC (Zn) COMPLEXÉS PAR ACIDE LIGNOSULPHONIQUE

AGROCE CORRIGE + 3 est un produit développé pour son application préventive et curative à travers des pulvérisations foliaires aussi bien en cultures d'herbacées que ligneuses. Complexe organique comme correcteur triple de zinc, manganèse et magnésium. Appliqué correctement et avec les doses adéquates il produit une augmentation notable des niveaux nutritionnels

CONTENU DÉCLARÉ

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau et complexé	2,50 % m/m
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau et complexé	2,50 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau et complexé	2,50 % m/m
Agent complexant : Acide Lignosulphonique pH: 3-5 / Densité: 1,25-1,30 g/cc	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au printemps et en été, si nécessaire appliquer aussi au début de l'automne.	Foliaire: 200-250 cc/hl
Arbres fruitiers	Appliquer au printemps et en été.	Foliaire: 200-250 cc/hl
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha chaque application
Vigne	Appliquer avant et après la floraison aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire: 200-250 cc/hl Générale: 2-3 L/ha
Bananiers	Au démarrage végétatif, lors d'une plus grande montée de sève et en moments de stress. Au début et en phase finale du grossissement. En application radiculaire au moment du remplissage des fruits.	Foliaire: 250-350 cc/hl Dose générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-10 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer durant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire: 200-250 cc/hl
Fruits rouges, framboises, etc.	En préventif dès les premières fleurs et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha chaque application
Pépinières ornementales	Peut s'appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Radiculaire: 2-3 cc/m ²
Oliviers	Appliquer durant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire: 200-250 cc/hl
Café	Appliquer durant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire: 200-250 cc/hl

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose suffisante pour appliquer la dose générale de 2-3 L/ha, en applications à faible volume appliquer la dose maximale. Peut être appliqué seul ou associé à des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. Il est conseillé de mélanger avec l'un de nos stimulants végétaux pour une assimilation plus rapide.

AGROCE Zn+Mn MAXI

MÉLANGE LIQUIDE DE MANGANÈSE (Mn) ET ZINC (Zn) EN PROVENANCE DE SULPHATES

AGROCE Zn+Mn MAXI est un correcteur concentré double de carence liquide qui contient de la LEBBINA (composé organique avec des groupes carboxyles qui coexistent avec les ions métalliques favorisant l'assimilation) d'absorption facile avec effet de baisse et montée de la sève des plantes. Produit qui par sa composition a un effet direct sur les jeunes plants, favorisant ainsi la photosynthèse et le développement foliaire. Indiqué durant tout le cycle végétatif mais spécialement au début de la pousse lorsque la plante a besoin d'un équilibre optimum pour une bonne floraison et ultérieure nouaison des fleurs.

CONTENU DÉCLARÉ

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	4,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	7,00 % m/m

p5-6 / Densité: 1,40 - 1,50 g/cc

Ce produit contient de la LEBBINA comme améliorant des principes actifs.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au printemps et en été, si nécessaire appliquer aussi au début de l'automne.	Foliaire : 200-250 cc/hl Irrigation : 12-24 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer au printemps et en été.	Foliaire : 200-250 cc/hl Irrigation : 12-24 L/ha
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-300 cc/hl Générale : 2-3 L/ha chaque application Irrigation : 12-20 L/ha
Vigne	Appliquer avant et après la floraison aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl Générale : 2-3 L/ha chaque application Irrigation : 12-20 L/ha
Bananiers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif en plusieurs irrigations.	Foliaire : 200-250 cc/hl Irrigation : 12-24 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl Irrigation : 12-24 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	En préventif dès les premières fleurs et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire : 200-300 cc/hl Générale : 2-3 L/ha chaque application Irrigation : 12-20 L/ha
Pépinières ornementales	Peut s'appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation: 2-3 cc/m².
Oliviers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl Irrigation : 12-24 L/ha
Café	Appliquer durant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl Irrigation : 12-24 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose suffisante pour appliquer la dose générale de 2-3 L/ha, en applications à faible volume appliquer la dose maximale. Peut être appliqué seul ou associé à des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. Il est conseillé de mélanger avec l'un de nos stimulants végétaux pour une assimilation plus rapide.



AGROCE Zn+Mn RADICULAR

MÉLANGE LIQUIDE DE MANGANÈSE (Mn) ET ZINC (Zn) CHÉLATÉS PAR EDTA

AGROCE Zn+Mn RADICULAR est un produit développé pour son application préventive et curative à travers des applications radiculaires aussi bien en cultures d'herbacées que de ligneuses. Le zinc est un micronutriment essentiel pour l'activation des processus enzymatiques, formation d'amidon, peptidases et protéines. Il empêche également la destruction d'auxines. Le manganèse, micronutriment essentiel pour la formation de la chlorophylle est un catalyseur des réactions d'oxydation-réduction de divers processus métaboliques. C'est un produit fortement spécifique pour l'activation de processus enzymatiques de la plante et pour la formation de protéine.

CONTENU DÉCLARÉ

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau chélaté par EDTA	3,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau chélaté par EDTA	5,00 % m/m

pH: 3-4 / Densité: 1,25-1,30 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au printemps et en été, si nécessaire appliquer aussi au début de l'automne.	Irrigation: 10-20 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer au printemps et en été.	Irrigation: 10-20 L/ha
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Irrigation: 12-20 L/ha
Vigne	Appliquer avant et après la floraison aussi bien en préventif qu'en curatif.	Irrigation: 12-20 L/ha
Bananiers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif en plusieurs irrigations.	Irrigation: 10-20 L/ha
Cultures tro-picales	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Irrigation: 10-20 L/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	En préventif dès les premières fleurs et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Irrigation: 10-20 L/ha
Pépinières ornementales	Peut s'appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation: 2-3 cc/m ²
Oliviers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Irrigation: 10-20 L/ha
Café	Appliquer durant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Irrigation: 10-20 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose suffisante pour appliquer la dose générale de 2-3 L/ha, en applications à faible volume appliquer la dose maximale. Peut être appliqué seul ou associé à des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. Il est conseillé de mélanger avec l'un de nos stimulants végétaux pour une assimilation plus rapide. En radiculaire mélanger à des acides aminés, matières organiques ou acides humiques.

AGROCE MIX Q-7

SOLUTION DE MAGNÉSIUM (MG) (6) AVEC MICRONUTRIMENTS

AGROCE MIX Q-7 est un mélange liquide de microéléments qui contient de la LEBBINA (composé organique avec des groupes carboxyles qui coexistent avec les ions métalliques favorisant son assimilation) totalement solubles pour être utilisés aussi bien par voie racinaire que par voie foliaire. Les microéléments sont fondamentaux pour la nutrition des plantes bien qu'ils soient nécessaires en petites proportions. Une carence de l'un d'eux peut se manifester tardivement et la culture ne se développera pas normalement. Il est donc essentiel de réaliser des traitements de prévention sans attendre la manifestation de la carence.

CONTENU DÉCLARÉ

Bore (B) soluble dans l'eau	0,30 % m/m
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,20 % m/m
Fer (Fe) soluble dans l'eau	1,50 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	1,00 % m/m
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,10 % m/m
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,30 % m/m

pH: 1-3 / Densité: 1,30-1,35 g/cc

Ce produit contient de la LEBBINA comme améliorateur des principes actifs.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer au printemps et en été, si nécessaire appliquer aussi au début de l'automne.	Foliaire : 200-250 cc/hl
Arbres fruitiers	Appliquer au printemps et en été.	Foliaire : 200-250 cc/hl
Horticulture	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-300 cc/hl Générale : 2-3 L/ha chaque application
Vigne	Appliquer avant et après la floraison aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl Générale : 2-3 L/ha
Bananiers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif en plusieurs irrigations.	Foliaire : 200-250 cc/hl
Cultures tropicales	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl
Fruits rouges, framboises, etc.	En préventif dès les premières fleurs et durant tout le cycle végétatif pour les carences manifestes.	Foliaire : 200-300 cc/hl Générale : 2-3 L/ha chaque application
Pépinières ornementales	Peut s'appliquer pendant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Irrigation: 2-3 cc/m ²
Oliviers	Appliquer pendant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl
Café	Appliquer durant tout le cycle végétatif aussi bien en préventif qu'en curatif.	Foliaire : 200-250 cc/hl

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser la dose suffisante pour appliquer la dose générale de 2-3 L/ha, en applications à faible volume appliquer la dose maximale. Peut être appliqué seul ou associé à des phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou faire un essai au préalable. Il est conseillé de mélanger avec l'un de nos stimulants végétaux pour une assimilation plus rapide.



AGROCE MIXLAND

MÉLANGE SOLIDE DE MICRONUTRIMENTS CHÉLATÉS PAR EDTA ET EDDHA

AGROCE MIXLAND est un correcteur de carences multiples sous forme de poudre soluble. Le fer est chélaté par EDTA et EDDHA et le manganèse, le zinc et le cuivre par EDTA, ce qui garantit leur stabilité et leur disponibilité pour un large intervalle de pH. Le bore et le molybdène sont présents sous forme minérale totalement soluble et assimilable par les plantes.

CONTENU DÉCLARÉ

Bore (B) soluble dans l'eau	0,50 % m/m
Cuivre (Cu) chélaté EDTA soluble dans l'eau	0,50 % m/m
Fer (Fe) soluble dans l'eau	7,00 % m/m
Fer (Fe) chélaté par EDTA	6,50 % m/m
Fer (Fe) chélaté par EDDHA	0,50 % m/m
Manganèse (Mn) chélaté EDTA soluble dans l'eau	3,00 % m/m
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,20 % m/m
Zinc (Zn) chélaté EDTA soluble dans l'eau	0,50 % m/m

pH: 2,5-3,5 (10 % de dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Arbres fruitiers	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Fruits tropicaux	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Café	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Horticulture	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment en bourgeonnement.	Foliaire : 75-100 g/hl. Irrigation : 4-8 kg/ha.
Vigne	Peut être appliqué en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Bananiers	Peut être appliqué en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment en floraison.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Plantes ornementales	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment en floraison.	Irrigation : 2-3 g/m².

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Bien que recommandé par voie racinaire, **AGROCE MIXLAND** peut être appliqué par voie foliaire. Il est recommandé d'utiliser la bouillie suffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Peut être appliqué seul ou avec des traitements phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable. En application foliaire ne pas traiter à température supérieure à 25°C. Respecter les doses indiquées.

AGROCE MIXTRAL

MÉLANGE SOLIDE DE MICRONUTRIMENTS CHÉLATÉS PAR EDTA

AGROCE MIXTRAL est un correcteur de carences multiples sous forme de poudre soluble. Le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre sont chélatés par EDTA, ce qui garantit leur stabilité et leur disponibilité pour un large intervalle de pH. Le bore et le molybdène sont présents sous forme minérale totalement soluble et assimilable par les plantes.

CONTENU DÉCLARÉ

Bore (B) soluble dans l'eau	2,50 % m/m
Cuivre (Cu) chélaté EDTA soluble dans l'eau	0,50 % m/m
Fer (Fe) chélaté EDTA soluble dans l'eau	7,00 % m/m
Manganèse (Mn) chélaté par EDTA soluble dans l'eau	5,00 % m/m
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,40 % m/m
Zinc (Zn) chélaté EDTA soluble dans l'eau	3,00 % m/m

pH : 4-5 (5 % de dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Arbres fruitiers	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Fruits tropicaux	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Café	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment au début du printemps et de l'été.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Horticulture	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment en bourgeonnement.	Foliaire : 75-100 g/hl. Irrigation : 4-8 kg/ha.
Vigne	Peut être appliqué en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Bananiers	Peut être appliqué en prévention à l'apparition des premières pousses, ou en Curatif dès l'apparition de la carence.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment en floraison.	Foliaire : 100-150 g/hl. Irrigation : 5-10 kg/ha.
Plantes ornementales	Peut être appliqué pendant tout le cycle végétatif, notamment en floraison.	Irrigation : 2-3 g/m².

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Bien que recommandé par voie radiculaire, **AGROCE MIXTRAL** peut être appliqué par voie foliaire. Il est recommandé d'utiliser le liquide suffisant pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Peut être appliqué seul ou avec des traitements phytosanitaires, en tenant toujours compte des incompatibilités du mélange ou en réalisant un essai au préalable.

AGROCÉ MIX Q-6

MÉLANGE SOLIDE DE MICRONUTRIMENTS CHÉLATÉS PAR EDTA

AGROCE MIX Q-6 est un correcteur de carences multiples chélaté en forme WSP pour son application par voie foliaire et radiculaire. Il se présente sous forme totalement chélatée pour que la culture puisse en profiter au maximum puisque l'agent chélatant protège l'ion métallique de possibles blocages.

CONTENU DÉCLARÉ

Bore (B) soluble dans l'eau	0,50 % m/m
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,50 % m/m
Fer (Fe) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	8,00 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	3,30 % m/m
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,20 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,75 % m/m

pH: 6-7 (10 % dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Il peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 5-10 kg/ha
Arbres fruitiers	Il peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 5-10 kg/ha
Horticulture	Il peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence en durant la pousse.	Foliaire: 75-100 g/hl Radiculaire: 4-8 kg/ha
Vigne	En cas de besoin appliquer en préventif pour les premières pousses ou en curatif quand la carence apparaît.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 5-10 kg/ha
Bananiers	En cas de besoin appliquer en préventif pour les premières pousses ou en curatif quand la carence apparaît.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 5-10 kg/ha
Cultures tropicales	Il peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 5-10 kg/ha
Fruits rouges, framboises, etc.	Il peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 5-10 kg/ha
Pépinières ornementales	Il peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence en floraison.	Radiculaire: 2-3 g/m ²
Café	Il peut être appliqué durant tout le cycle végétatif, de préférence au début du printemps et été.	Foliaire: 100-150 g/hl Radiculaire: 5-10 kg/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Bien qu'il peut être utilisé en application foliaire ce produit est préparé pour son application radiculaire. Il est recommandé d'utiliser la quantité suffisante pour que le produit pénètre dans toutes les parties de la plante. Il peut être appliqué seul ou associé à des phytosanitaires, tenant toujours compte des incompatibilités de mélange ou en faisant un essai au préalable. En application foliaire, ne traiter en aucun cas avec des températures supérieures à 25°C. Respecter les doses indiquées



La qualité des fruits et légumes qui arrivent chez le consommateur, leurs caractéristiques organoleptiques, leur goût ou arôme, leur composition chimique, l'apparence externe, leur comportement après la récolte ainsi que la rentabilité obtenue sont le résultat de conditions environnementales, de la labour des champs et des produits agro-nutritionnels utilisés pendant le cycle de culture. Pour produire quantité et qualité, il est nécessaire d'avoir une bonne nutrition de la plante pendant toute la période qui précède la récolte.

La gamme **Améliorateurs de Récolte** est dirigée à l'obtention de cultures à fort rendement.



4

AMÉLIORATEURS DE RÉCOLTE

AGROCÉ K-33 ACID

AGROCÉ K-44 EXPRESS

AGROCÉ POTASIO K-52

AGROCÉ POTASIO TURBO

AGROCÉ NEUTRAL POTASH

AGROCÉ X-23

AGROCÉ K-33 ACID

SOLUTION POTASSIQUE K 23

AGROCE K-33 ACID est un nutriment potassique à forte teneur en potassium facilement assimilable par la plante. Produit conçu pour toutes les cultures qui présentent des besoins nutritifs élevés de potassium. Favorise l'assimilation de calcium et de magnésium, ce qui favorise la correction de plusieurs et complexes physiopathies, comme la chlorose de la feuille. Aide à la synthèse des sucres et protéines. Augmente la résistance du fruit. Améliore la consistance cellulaire de la plante. Précurseur enzymatique avec action sur le calibre et la production. Formulation totalement exemptée de chlorures.

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau | 23,00 % m/m

pH: 7-8 / Densité: 1,38-1,42 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-20 L/ha
Arbres fruitiers	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-20 L/ha
Horticulture	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-20 L/ha
Vignes	Réaliser 1-2 applications 10 jours après la véraison et 40 jours avant la récolte.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Bananiers	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Radiculaire: 10-30 L/ha
Cultures tropicales	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-20 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-20 L/ha
Oliviers	Réaliser plusieurs applications entre Juillet et Octobre.	Foliaire: 250-400 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Café	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-20 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit préparé pour son application foliaire et radiculaire. En application foliaire il peut être mélangé à la plupart des phytosanitaires, en cas de doute faire un essai au préalable. Pour les agrumes et les arbres fruitiers il est conseillé de l'appliquer après la chute des pétales. Pour la vigne à vin il est nécessaire d'être stricts par rapport aux jours précédant la récolte pour tout type de potassium.

AGROCÉ K-44 EXPRESS

SOLUTION POTASSIQUE K 30

AGROCE K-44 EXPRESS est un produit à forte concentration en potassium (K₂O) soluble dans l'eau, à appliquer de préférence par la racine. L'application de matière organique avec 2% d'extrait humique total facilite l'assimilation du nutriment en l'empêchant de se bloquer. L'un des problèmes de la phase d'e grossissement des fruits est que les quantités importantes de nitrate de potassium incorporées ne permettent pas d'obtenir un résultat optimal en cas de grossissement rapide des fruits en raison du blocage existant du potassium dans le sol. De plus, peu importe la quantité appliquée, la solution n'est pas obtenue. **AGROCE K-44 EXPRESS** C'est un potassium très assimilable par la racine et il est formulé de telle sorte qu'il soit bloqué le moins possible et que la culture pousse et mûrisse au rythme souhaité. Pour les fruitiers à noyau, la première application coïncide avec la phase de sa formation

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau | 30,00 % m/m

pH: 13-14 / Densité: 1,39-1,41 g/cc

Ce produit, par sa provenance, contient 8% d'extrait humique total.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer à partir de 50% de grossissement	Foliaire: 300-500 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 2-3 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer à partir de 50% de grossissement	Radiculaire: 5-20 L/ha
Horticulture	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Radiculaire: 5-20 L/ha
Vignes	Réaliser 1-2 applications 10 jours après la véraison et 40 jours avant la récolte.	Radiculaire: 5-20 L/ha
Bananiers	Partager la dose de Août à Décembre.	Radiculaire: 5-40 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer à partir de 50% de grossissement	Radiculaire: 5-20 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Radiculaire: 5-20 L/ha
Oliviers	Réaliser plusieurs applications entre Juillet et Octobre.	Foliaire: 300-500 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 10-20 L/ha
Café	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Radiculaire: 5-20 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit préparé pour son application foliaire et radiculaire pour toute sorte de cultures. En application foliaire il peut être mélangé à la plupart de phytosanitaires, en cas de doute faire un essai au préalable. En cas de grande production il est conseillé d'augmenter les doses jusqu'à 30-40 L/ha.

Pour la vigne à vin il est nécessaire d'être stricts par rapport aux jours précédant la récolte pour tout type de potassium

AGROCÉ POTASIO K-52

SOLUTION NK 3-32

AGROCE POTASIO K-52 est un nutriment potassique (K_2O) soluble dans l'eau à forte teneur en potassium EDTA facilement assimilable par la plante. Le produit est conçu pour toutes les cultures qui présentent de forts besoins nutritionnels de potassium. Il favorise l'assimilation du calcium et du magnésium favorisant la correction de diverses et complexes physiopathies comme la chlorose de la feuille.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	3,00 % m/m
Azote (N) uréique	3,00 % m/m
Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau	32,00 % m/m

pH: 12-14 / Densité: 1,50-1,52 g/cc

Ce produit contient un agent chélatant EDTA

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-30 L/ha
Arbres fruitiers	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-30 L/ha
Horticulture	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-30 L/ha
Vignes	Réaliser 1-2 applications 10 jours après la véraison et 40 jours avant la récolte.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 10-30 L/ha
Bananiers	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Radiculaire: 10-30 L/ha
Cultures tropicales	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-30 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-30 L/ha
Oliviers	Réaliser plusieurs application entre Juillet et Octobre.	Foliaire: 250-400 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 10-30 L/ha
Café	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 5-30 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit préparé pour son application foliaire et radiculaire. En application foliaire faire un essai au préalable et utiliser les conditionneurs de pH de notre catalogue. Pour les agrumes et les arbres fruitiers appliquer après la chute des pétales. Pour la vigne à vin il est nécessaire d'être stricts par rapport aux jours précédant la récolte pour tout type de potassium. Ne pas utiliser à température élevée

AGROCÉ POTASIO TURBO

ENGRAIS NK 3-50 AVEC MICRONUTRIMENTS CHÉLATÉS PAR EDTA

AGROCE POTASIO TURBO possède une teneur de 50 % de potassium soluble en eau, assimilable par voie racinaire et foliaire. Le produit est une formulation spécialement créée pour toutes ces cultures qui présentent des besoins nutritionnels de potassium élevés. Favorise la synthèse des sucres et des protéines. Intervient dans la régulation stomatique. Augmente la résistance du fruit et influe sur le volume des fruits. Améliore la consistance cellulaire de la plante.

CONTENU DÉCLARÉ

Azote (N) total	3,00 % m/m
Azote (N) uréique	3,00 % m/m
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	50,00 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 % m/m
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,01 % m/m
Fer (Fe) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,05 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau et chélaté par EDTA	0,01 % m/m

pH: 10-11 (dissolution 10 %)

En raison de son origine, ce produit contient 10% d'agent chélatant EDTA et 12% d'anhydride sulfureux (SO₃) hydrosoluble.

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 5-20 kg/ha
Arbres fruitiers	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 5-20 kg/ha
Horticulture	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Foliaire: 200-300 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 5-20 kg/ha
Vignes	Réaliser 1-2 applications 10 jours après la véraison et 40 jours avant la récolte.	Foliaire: 200-350 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 10-20 kg/ha
Bananiers	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Radiculaire: 10-30 kg/ha
Cultures tropicales	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 5-20 kg/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	Partager la dose pour chacune des floraisons au moment du grossissement.	Foliaire: 200-350 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 5-20 kg/ha
Oliviers	Réaliser plusieurs application entre Juillet et Octobre.	Foliaire: 200-400 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 10-20 kg/ha
Café	Renforcer les doses au début et à la fin du grossissement partageant le reste entre les deux.	Foliaire: 200-350 g/hl Générale: 2-3 kg/ha Radiculaire: 5-20 kg/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit préparé pour son application foliaire et racinaire. En application foliaire il peut être mélangé à la plupart des phytosanitaires, en cas de doute faire un essai au préalable. Pour les agrumes et les arbres fruitiers il est conseillé de l'appliquer après la chute des pétales Pour la vigne à vin il est nécessaire d'être stricts par rapport aux jours précédant la récolte et pour tout type de potassium.

AGROCÉ NEUTRAL POTASH

ENGRAIS POTASSIQUE K (SO₃) 50 (23) AUX MICRONUTRIMENTS

Avec sa forte teneur en potassium très soluble dans l'eau, assimilable par voie racinaire et foliaire, **AGROCE NEUTRAL POTASH** est une formule particulièrement conçue pour toutes les cultures présentant d'importants besoins nutritifs en potassium. Il favorise la synthèse du sucre et des protéines, intervient dans la régulation stomatique, augmente la résistance du fruit, influence son volume et améliore la consistance cellulaire de la plante.

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	50,00 % m/m
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 % m/m
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,01 % m/m
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,05 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,01 % m/m
Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau	23,00 % m/m

pH : 2-3 (5 % de dissolution)

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Renforcer la dose au début et à la fin du développement en répartissant le reste entre les deux dernières doses.	Foliaire : 200-350 g/hl. Générale : 2-3 kg/ha. Radiculaire : 5-20 kg/ha.
Arbres fruitiers	Renforcer la dose au début et à la fin du développement en répartissant le reste entre les deux dernières doses.	Foliaire : 200-350 g/hl. Générale : 2-3 kg/ha. Radiculaire : 5-20 kg/ha.
Bananiers	Renforcer la dose au début et à la fin du développement en répartissant le reste entre les deux dernières doses.	Radiculaire : 10-30 kg/ha.
Fruits tropicaux	Renforcer la dose au début et à la fin du développement en répartissant le reste entre les deux dernières doses.	Radiculaire : 5-20 kg/ha. Foliaire : 200-350 g/hl. Générale : 2-3 kg/ha.
Café	Renforcer la dose au début et à la fin du développement en répartissant le reste entre les deux dernières doses.	Radiculaire : 5-20 kg/ha. Foliaire : 200-350 g/hl. Générale : 2-3 kg/ha.
Horticulture	Répartir la dose dans chacune des floraisons lors du développement.	Radiculaire : 5-20 kg/ha. Foliaire : 200-300 g/hl. Générale : 2-3 kg/ha.
Fruits des bois, framboises, etc.	Répartir la dose dans chacune des floraisons lors du développement.	Radiculaire : 5-20 kg/ha. Foliaire : 200-350 g/hl. Générale : 2-3 kg/ha.
Vigne	Réaliser 1-2 applications 10 jours après la véraison et 40 jours avant la récolte.	Radiculaire : 10-20 kg/ha. Foliaire : 200-350 g/hl. Générale : 2-3 kg/ha.
Oliviers	Réaliser plusieurs applications entre juillet et octobre.	Radiculaire : 10-20 kg/ha. Foliaire : 250-500 g/hl.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Produit préparé pour une application foliaire et racinaire. En application foliaire, il peut être mélangé avec la plupart des produits phytosanitaires. En cas de doute, réaliser un essai au préalable. Sur les agrumes et les arbres fruitiers, l'application est recommandée après la chute des pétales. Sur la vigne destinée à la vinification, il faut strictement respecter le délai avant la récolte du produit et pour tout type de potassium.

AGROCÉ X-23

SOLUTION POTASSIQUE K 6

AGROCE X-23 incorpore dans ses contenus et sa fabrication une technologie innovante qui augmente dans les fruits le contenu en sucres et réduit l'acidité ce qui favorise la maturation précoce.

Son principal composant, l'activateur, fait que l'activité de la photosynthèse augmente dans les cultures à travers l'augmentation de leur biomasse. Il a un aspect stimulant qui favorise l'assimilation maximale de certains nutriments comme le magnésium, le nitrogène, le phosphore et le fer.

CONTENU DÉCLARÉ

Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
--	------------

pH: 6-7 / Densité: 1,20 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Arbres fruitiers	1° Traitement à la chute des pétales 2° Traitement lorsque le fruit aura un tiers de sa taille finale. 3° Traitement au changement de couleur.	1 L/ha par application
Horticulture	1° Application lorsque nous aurons deux fleurs ouvertes 2° Application à peu près 20 jours avant la récolte En cas de climat adverse une troisième application pourrait être faite.	1 L/ha par application
Cultures tropicales	1° Traitement à la chute des pétales 2° Traitement lorsque le fruit aura un tiers de sa taille finale. 3° Traitement au changement de couleur.	1 L/ha par application
Fruits rouges, Framboises, etc	1° Application lorsque nous aurons deux fleurs ouvertes 2° Application à peu près 20 jours avant la récolte En cas de climat adverse une troisième application pourrait être faite.	1 L/ha par application

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

En application foliaire utiliser le volume suffisant pour appliquer la dose générale, Eviter les heures centrales de la journée quand il fait plus chaud. Quand plusieurs produits seront utilisés dans le mélange, appliquer des régulateurs de pH tout en respectant les incompatibilités de chaque produit.



La gamme **Spécialités Diverses** est formée de conditionneurs de pH, ainsi que de produits contenant des substances naturelles ou des combinaisons de nutriments qui aident à renforcer les plantes contre différentes attaques pathogènes. L'action préventive et curative de nos produits apporte aux cultures une vigueur végétative qui améliore leur rendement.



5

SPÉCIALITÉS DIVERSES

AGROCÉ CONTROL pH + 2

AGROCÉ CONTROL pH + 3

AGROCÉ GLUCUCÉ

AGROCE CONTROL

AGROCE CONTROL pH + 2 SOLUTION AZOTÉE

Pour réussir un maximum d'efficacité du traitement phytosanitaire et nutritionnel nous présentons **AGROCE CONTROL pH + 2** qui règle le pH du mélange au niveau nécessaire pour obtenir le meilleur résultat du traitement.

AGROCE CONTROL pH + 3 SOLUTION NP 4-15

AGROCE CONTROL pH + 3 est une solution NP formulée pour diminuer le pH des boullies phytosanitaires. Formulation liquide, qui contient des sels de phosphore synergisés avec des tensioactifs de grande qualité. Réduit la tension superficielle. Réduit la formation de mousse. Son utilisation évite la dégradation des matières actives (hydrolyse alcaline), tout en maintenant et améliorant l'efficacité des traitements.

CONTENU DÉCLARÉ

	AGROCE CONTROL pH + 2	AGROCE CONTROL pH + 3
Azote (N) total	4,00 % m/m	4,00 % m/m
Azote (N) uréique	4,00 % m/m	4,00 % m/m
Pentaoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau		15,00 % m/m
	pH: 2-3 / Densité 1.05 - 1.10 g / cc	pH: 1-2 / Densité 1.13 - 1.18 g / cc

* **AGROCE CONTROL pH + 2**: Ce produit, par sa provenance, contient 11% d'acides polyhydrocarboxyliques.

DOSES SELON LE TYPE D'EAU

AGROCE CONTROL pH + 2			AGROCE CONTROL pH + 3		
pH DE L'EAU	MOMENT D'INCORPORATION	DOSE POUR pH NEUTRE	pH DE L'EAU	MOMENT D'INCORPORATION	DOSE POUR pH NEUTRE
7,0-7,5	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	0,75 cc/hl	10,5	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	150 cc/hl
7,5-8,0	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	0,80 cc/hl	10	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	140 cc/hl
8,0-8,5	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	0,90 cc/hl	9,5	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	130 cc/hl
8,5-9,0	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	100 cc/hl	9,0	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	110 cc/hl
9,0-9,5	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	110 cc/hl	8,5	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	100 cc/hl
9,5-10	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	125 cc/hl	8,0	Remplir une demie cuve, appliquer le produit et faire le mélange du reste des produits.	0,80 cc/hl

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Les paramètres indiqués peuvent varier en fonction de la chaux active et des carbonates de chaux contenus dans l'eau à traiter. Il est conseillé de faire un essai au préalable. Pour neutraliser des cuves d'abonnement à forte concentration de produit, faire un essai au préalable et réviser la dose.



AGROCÉ GLUCUCÉ

SOLUTION D'ENGRAIS À BASE DE CUIVRE (Cu) EN PROVENANCE DE SULFATE

AGROCE GLUCUCÉ est un correcteur de carence de cuivre avec action bactéricide qui contrôle un large spectre de bactéries (Erwina, Xanthomonas, Pseudomonas, etc) et champignons (Alternaria, Botrytis, Cercospora, Mildiu, Oidium, Phytophthora, etc). Agit comme bactéricide et / ou fongicide.

CONTENU DÉCLARÉ

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
pH: 1-3 / Densité 1.25 - 1.28 g / cc	
Ce produit contient de la Lebbina comme améliorateur des principes actifs.	

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 150-200 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Arbres fruitiers	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Horticulture	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Vignes	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Bananiers	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Cultures tropicales	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Pépinières ornementales	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Oliviers	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha
Céréales	Bien que le produit ait un effet curatif, il est conseillé de l'appliquer en fonction préventive en évitant les moments de floraison.	Foliaire: 200-300 cc/hl Générale: 2-3 L/ha Radiculaire: 3-5 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

En irrigation appliquer pendant le tiers final de l'arrosage. En cas de problème important utiliser le volume suffisant pour mouiller toutes les parties de la plante. Pour l'olivier renforcer les traitements aux printemps et automnes pluvieux.



La famille d'**Activeurs Foliaires** se compose de produits formulés avec des matières premières de haute qualité et synergie pour apporter aux cultures macro et micronutriments par voie foliaire. Ces produits sont utilisés pour avoir une réponse rapide et efficace aux divers besoins nutritionnels apparaissant au cours des différents moments phénologiques de la production.



6

ACTIVATEURS FOLIAIRES

AGROCÉ FOLIAIRES SOLUBLES
AGROCÉ FOLIAIRES LIQUIDOS
AGROCÉ NITRO PLUS 42

AGROCÉ FOLIAIRES SOLUBLES

ENGRAIS SOLIDE NPK AVEC MICRONUTRIMENTS CHÉLATÉS EDTA

Les fertilisants **AGROCE FOLIAIRES SOLUBLES** sont des produits formulés à base de matières premières de grande qualité, pureté, solubilité et parfaitement équilibrés pour obtenir les résultats souhaités. La variété de formulations nous permet d'offrir la meilleure concentration pour chaque moment phénologique de la plante.

CONTENU DÉCLARÉ

Contenu Déclaré (m/m)	30-10-10	28-4-14	25-25-12	25-5-25	20-20-20	12-5-42	10-5-40	0-15-42	12-6-36	12-10-30
Azote (N)	30,0 %	28,0 %	25,0 %	25,0 %	20,0 %	12,0 %	10,0 %	0,0 %	12,0 %	12,0 %
Pentoxyde de Phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	10,0 %	4,0 %	25,0 %	5,0 %	20,0 %	5,0 %	5,0 %	15,0 %	6,0 %	10,0 %
Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	10,0 %	14,0 %	12,0 %	25,0 %	20,0 %	42,0 %	40,0 %	42,0 %	36,0 %	30,0 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,80 %	0,01 %	0,01 %
Cuivre (Cu) EDTA soluble dans l'eau	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Fer (Fe) EDTA soluble dans l'eau	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Manganèse (Mn) EDTA soluble dans l'eau	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zinc (Zn) EDTA soluble dans l'eau	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-500 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha
Arbres fruitiers	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-500 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha
Cultures horticoles	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-350 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha
Vignes	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-500 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha
Bananiers	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-500 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha
Cultures tropicales	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-500 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha
Fruits rouges, Framboises, etc	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-350 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha
Oliviers	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 500-750 g/hl Générale: 5-7,5 kg/ha
Café	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-500 g/hl Générale: 2,5-5 kg/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé de réaliser des applications en utilisant la quantité suffisante pour atteindre toutes les parties de la plante. En applications à faible volume utiliser les doses maximales tenant compte des doses totales par hectare. Le produit peut se mélanger à des traitements phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités et en cas de besoin utiliser nos conditionneurs de pH.

AGROCE FOLIAIRES LIQUIDOS

SOLUTION NPK AVEC MICRONUTRIMENTS CHÉLATÉS EDTA

Les fertilisants **AGROCE FOLIAIRES LIQUIDOS** sont des produits formulés à base de matières premières de grande qualité, pureté, solubilité et parfaitement équilibrés pour obtenir les résultats souhaités.

AGROCE NITRO PLUS 42 est une solution riche en azote très assimilable. Des éléments mouillants et pénétrants sont ajoutés pour obtenir un maximum d'efficacité.

CONTENU DÉCLARÉ

Contenu Déclaré (m/v)	25-6-4	14-8-8	9-9-9	20-5-15	12-25-12	10-5-30	6-17-36	6-30-37
Azote (N)	25,0 %	14,0 %	9,0 %	20,0 %	12,0 %	10,0 %	6,0 %	6,0 %
Pentaoxyde de Phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	6,0 %	8,0 %	9,0 %	5,0 %	25,0 %	5,0 %	17,0 %	30,0 %
Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	4,0 %	8,0 %	9,0 %	15,0 %	12,0 %	30,0 %	36,0 %	37,0 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %
Cuivre (Cu) EDTA soluble dans l'eau	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %
Fer (Fe) EDTA soluble dans l'eau	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %	0,030 %
Manganèse (Mn) EDTA soluble dans l'eau	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %
Zinc (Zn) EDTA soluble dans l'eau	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %

AGROCE NITRO PLUS 42

SOLUTION RICHE EN AZOTE

Azote (N) total 42,00 % m/v

Azote (N) nitrique 10,50 % m/v

Azote (N) ammoniacal 10,50 % m/v

Azote (N) uréique 21,00 % m/v

pH: 6-8
Densité: 1,32 g/cc

CULTURES, DOSES ET PÉRIODES D'APPLICATION

CULTURES	PÉRIODES D'APPLICATION	DOSES
Agrumes	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 500-550 cc/hl Générale: 3-5 L/ha
Arbres fruitiers	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 350-500 cc/hl Générale: 3-5 L/ha
Cultures horticoles et Vignes	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha
Bananiers	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 300-500 cc/hl Générale: 2-3 L/ha
Cultures tropicales	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha
Fruits rouges, Framboises, etc.	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha
Oliviers	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 500-750 cc/hl Générale: 5-7,5 L/ha
Café	Appliquer à tout moment du cycle de culture avec la formulation adéquate. Consultez votre technicien spécialisé.	Foliaire: 250-350 cc/hl Générale: 2-3 L/ha
Cereals	Avec des herbicides ou produits phytosanitaires.	Foliaire: 150-250 cc/hl Générale: 1-2 L/ha

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION

Il est conseillé de réaliser des applications en utilisant la quantité suffisante pour atteindre toutes les parties de la plante. En applications à faible volumen utiliser les doses maximales tenant compte des doses totales par hectare. Le produit peut se mélanger à des traitements phytosanitaires tenant toujours compte des incompatibilités et en cas de besoin utiliser nos conditionneurs de pH.



La famille de **Nutrition Hydrosoluble** est composée par des produits qui incorporent dans leur formulation aussi bien des macronutriments que des micronutriments pour appliquer aux systèmes de fertirrigation.

Leur formulation et la qualité des matières premières utilisées assurent une bonne solubilité et une optimale réponse agronomique couvrant les plus grandes besoins de nos cultures.



7

NUTRITION HYDROSOLUBLE

**HYDROSOLUBLE CRYSTALLINE FERTIRRIGATION
HYDROSOLUBLE INNOVATIVE PLUS**

HYDROSOLUBLE CRYSTALLINE FERTIRRIGATION

AGROCE 23-6-6. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	23,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	6,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

AGROCE 19-6-6. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	19,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	6,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	6,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

AGROCE 17-6-18. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	17,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	6,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	18,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

AGROCE 20-20-20. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	20,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	20,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	20,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

AGROCE 13-40-13. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	13,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	40,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	13,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

AGROCE 15-7-22. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	15,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	7,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	22,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

AGROCE 10-5-40. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	10,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	5,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	40,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

AGROCE 15-5-30. ENGRAIS NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Azote (N) total	15,00 % m/m
Pentoxyde de phosphore (P_2O_5) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	5,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau	30,00 % m/m
Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc	

MICRONUTRIMENTS SOLUBLES

Bore (B) soluble dans l'eau	0,02 % m/m
Manganèse(Mn) soluble dans l'eau	0,05 % m/m
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,005 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,05 % m/m



HYDROSOLUBLE INNOVATIVE PLUS

ENGRAIS SOLIDE NPK AVEC MICRONUTRIMENTS

Nouvelle gamme **HYDROSOLUBLE INNOVATIVE PLUS** plus une MOLÉCULE ORGANIQUE (polyhydroxycarboxyl) qui produit dans la culture une très importante activité énergétique. Cette famille de produits incorpore des macronutriments et des micronutriments qui avec la molécule organique produisent une très rapide absorption des nutriments par la plante et l'amélioration de la nutrition par voie racinaire.

AGROCE STARTER PLUS

Azote (N) total	23,00 % m/m
Pentaoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	6,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	6,00 % m/m

Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc
10 % POLYHYDROXYCARBOXYLIQUES

AGROCE BLOOMING PLUS

Azote (N) total	12,00 % m/m
Pentaoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	36,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	12,00 % m/m

Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc
10 % POLYHYDROXYCARBOXYLIQUES

AGROCE FATTING PLUS

Azote (N) total	15,00 % m/m
Pentaoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	5,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	30,00 % m/m

Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc
10 % POLYHYDROXYCARBOXYLIQUES

AGROCE UNIVERSAL PLUS

Azote (N) total	18,00 % m/m
Pentaoxyde de phosphore (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau et dans du citrate d'ammonium neutre	18,00 % m/m
Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	18,00 % m/m

Contient: Bore, Manganèse, Molybdène, Zinc
10 % POLYHYDROXYCARBOXYLIQUES

MICRONUTRIMENTS SOLUBLES

Bore (B) soluble dans l'eau	0,02 % m/m
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,05 % m/m
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,005 % m/m
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,05 % m/m



Fertinara

www.fertinara.com